

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»**

**Методические материалы для предметных  
комиссий субъектов Российской Федерации  
по проверке выполнения заданий с развернутым  
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2024 года**

# **МАТЕМАТИКА**

**Москва  
2024**

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по математике И.В. Ященко, в.н.с. ФГБНУ «ФИПИ».

Авторы–составители: И. В. Ященко, И. Р. Высоцкий, П. И. Самсонов.

Пособие предназначено для подготовки экспертов по оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике.

Методические материалы включают в себя описание экзаменационной работы 2023 г., научно-методические подходы к проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом, примеры ответов участников экзамена с комментариями к оценке этих ответов, а также материалы для самостоятельной работы эксперта.

Авторы будут благодарны за предложения по совершенствованию пособия.

© И. В. Ященко, И. Р. Высоцкий, П. И. Самсонов  
© Федеральный институт педагогических измерений. 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	4
Часть 1. Характеристика экзаменационной работы и общие подходы к оцениванию заданий.....	6
Характеристика экзаменационной работы ОГЭ.....	6
Общие подходы к проверке и оцениванию решений заданий с развернутым ответом.....	7
Примеры решений, оцененных отдельными экспертами не в соответствии с критериями .....	10
Часть 2. Примеры оценивания решений заданий 20 – 25 с краткими комментариями .....	16
Задание 20 .....	16
Задание 21 .....	20
Задание 22 .....	24
Задание 23 .....	28
Задание 24 .....	32
Задание 25 .....	36
ЧАСТЬ 3 Материалы для практических занятий.....	40
Задание 20 .....	40
Задание 21 .....	51
Задание 22 .....	59
Задание 23 .....	66
Задание 25 .....	76
Комментарии и оценивание .....	82
ЧАСТЬ 4 Материалы по оценке решений заданий с развернутым ответом для зачета или квалификационной работы .....	84
Вариант 1 .....	86
Вариант 2 .....	91
Вариант 3 .....	96
Вариант 4 .....	102
Вариант 5.....	107
Ответы и комментарии к материалам части 4 .....	113

## **Введение**

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта. В ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы стандартных заданий.

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.

Содержание КИМ определяется Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и Федеральной образовательной программой основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 под №370).

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») и Федеральной примерной программой основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).

Настоящее пособие предназначено для подготовки экспертов по оцениванию заданий с развернутым ответом, которые являются частью измерительных материалов КИМ для основного государственного экзамена по математике. Пособие состоит из трех частей.

В первой части дается краткое описание КИМ ОГЭ по математике 2024 г., характеризуются общие подходы к применению критериев оценивания решений заданий с развернутым ответом, приводятся примеры оценивания решений и даются комментарии, объясняющие выставленную оценку.

Во второй части в целях организации самостоятельной и групповой работы экспертов приводятся примеры решений, которые эксперты должны по результатам коллективного обсуждения оценить в соответствии с критериями оценивания выполнения заданий с развернутым ответом. Задания снабжены комментариями и ответами, помещенными в конце второй части.

В третьей части «Материалы для проведения зачёта» приведены примеры решений заданий с развернутым ответом, предназначенные для проведения индивидуальных зачетных работ по проверке подготовки экспертов.

Каждое задание второй части КИМ ОГЭ по математике оценивается в баллах. Максимальный балл равен 2.

	Нумерация заданий						Общ. балл
Задание	№ 20	№ 21	№ 22	№ 23	№ 24	№ 25	
Максимальный балл	2	2	2	2	2	2	12

Тематическая принадлежность заданий осталась неизменной по сравнению с 2023 г. А именно, задание № 20 – упрощение алгебраических выражений, решение уравнений или систем уравнений, № 21 – текстовая задача, № 22 – построение графика функции, № 23 – геометрическая задача на вычисление, № 24 – геометрическая задача на доказательство, № 25 – геометрическая задача высокого уровня сложности.

## **Часть 1. Характеристика экзаменационной работы и общие подходы к оцениванию заданий**

### **Характеристика экзаменационной работы ОГЭ**

Контрольные измерительные материалы (далее КИМ) разработаны с учётом положения, что результатом освоения основной образовательной программы основного общего образования должна стать математическая компетентность выпускников, т.е. они должны: овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельности; научиться преобразованию знания и его применению в учебных и внеучебных ситуациях; сформировать качества, присущие математическому мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Работа состоит из двух частей, соответствующих проверке на базовом, повышенном и высоком уровнях.

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять базовые математические знания в практических ситуациях.

Задания *части 2* направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный контингент профильных классов.

Эти части содержат задания повышенного уровня сложности из различных разделов курса математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности – от простых к сложным, предполагающим свободное владение материалом и высокий уровень математической культуры.

Все задания второй части носят комплексный характер. Они позволяют проверить способность к соединению знаний из различных тем школьного курса, владение широким набором приемов и способов рассуждений, а также умение грамотно записывать решение.

Задания части 2 относятся к алгебре и геометрии. Задание 20 (алгебраическое), задание 23 (геометрическое) – наиболее простые. Они направлены на проверку владения формально-оперативными алгебраическими навыками: преобразование выражения, решение уравнения, неравенства, системы, построение графика и умению решить несложную задачу на вычисление геометрической величины.

Задание 21 (алгебраическое), задание 24 (геометрическое) – более высокого уровня, они сложнее предыдущих.

И, наконец, задания 22 (алгебраическое), задание 25 (геометрическое) – высокого уровня сложности, они требуют свободного владения материалом и высокого уровня математической культуры. Рассчитаны эти задачи на обучающихся, изучавших математику, в рамках углубленного курса математики. При их выполнении

участник экзамена должен продемонстрировать владение широким набором общематематических приемов, проявить элементарные умения исследовательского характера, которые помогут успешно продолжать образование в 10–11 классах углубленного или профильного изучения математики, информатики и естественно-научных дисциплин.

### **Общие подходы к проверке и оцениванию решений заданий с развернутым ответом**

Самое важное требование к выполнению заданий с развернутым ответом заключаются в следующем: решение должно быть математически грамотным и завершенным. Из решения должен быть понятен ход рассуждений. Участник экзамена может ограничиться краткими пояснениями без подробного описания известных алгоритмов и ссылок на общеизвестные факты. Лаконичное решение, содержащее все основные шаги решения, не содержащее неверных утверждений и ошибочных выкладок, следует рассматривать как решение без недостатков. Краткое, лаконичное, математически верное решение свидетельствуют о высокой математической культуре участника экзамена и должно высоко оцениваться.

Если решение задания второй части (20 – 25) удовлетворяет этим требованиям, то за него следует выставить 2 балла. При этом решение может содержать ошибки, не влияющие на ход решения и ответ, несущественные неточности в терминологии или обозначениях. Также не снижаются баллы за нерациональное решение, решение содержащее избыточные рассуждения.

Если эксперт делает общее заключение о том, что участник экзамена решил задачу, но решение не доведено до численного ответа или допущена непринципиальная вычислительная ошибка, не влияющая на ход решения, или имеются несущественные недостатки (например, отсутствие обоснования вспомогательных фактов), то за решение выставляется 1 балл.

Если решение отсутствует (в частности, приведен только верный ответ), состоит из фрагментарных записей, несвязных рассуждений или содержит существенную математическую ошибку, то за решение следует выставить 0 баллов. Этую же оценку – 0 баллов – следует выставить и в том случае, если незначительная ошибка в записях или даже описка привели к изменению задачи.

Участник экзамена может использовать, без доказательств и обоснований, утверждения, факты, методы из любого действующего учебника. Если утверждение отсутствует в учебниках или избыточно, но эквивалентно общему (например, утверждение о подобии треугольников по трем углам), то оно является истинным, и потому использование такого утверждения не является ошибкой.

В решении текстовых или сюжетных задач, где требуется составление стандартной математической модели (например, задачи на движение), отсутствие комментариев к составлению уравнения и его решению, в общепринятых, естественных обозначениях и ограничениях на переменные (явно следующих из условия задачи), не является основанием для снижения баллов.

На основе накопленного опыта можно сформулировать несколько принципов работы эксперта.

1. Эксперт *не оценивает оформление задания* – расположение текста и выкладок, наличие или отсутствие тех или иных элементов записи и т.п. Эксперт оценивает только математическую грамотность и полноту данного решения.

2. Следует различать функции ГИА и текущего контроля. Разумеется, грамотный учитель, в своей текущей работе, отрабатывает и рациональные подходы к решению, и оптимальные способы его записи, требует от своих учеников дополнительных обоснований и проверок, которые уменьшают возможность допустить ошибку. При этом, на итоговом контроле, если участник экзамена не допустил ошибок и изложил корректное решение, пусть и отличающееся от того, которое приводилось на уроке или в учебнике, то это решение должно быть оценено в полное число баллов. Таким образом, при проверке эксперт *не должен опираться на свой методический опыт, требовать наличия конкретных, привычных ему, подходов к оформлению решения*, поскольку это приводит к субъективному расширению критериев оценивания.

3. Следует оценивать *грамотность и истинность утверждений и формулировок, данных в решении*. Не следует оценивать их соответствие формулировкам определенного учебника.

4. Ключевая задача ОГЭ по математике – дать возможность участнику экзамена продемонстрировать уровень освоения требований ФГОС. Избыточные требования при проверке приводят к получению нулевых баллов, как и участниками экзамена, вообще не приступившими к выполнению задания, так и участниками, которые математически верно его выполнили, но изложили в форме, отличной от ожидаемой конкретным экспертом. Это приводит к демотивации как школьников, так и учителей, к снижению количества участников экзамена приступивших к выполнению заданий второй части экзамена и, в целом, количества школьников, выбирающих профильный уровень изучения математики.

Результаты проверки фиксируются в протоколе проверки развернутых ответов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Организационно-технологическая схема, используемая при проведении ОГЭ в субъектах Российской Федерации, может предполагать заполнение протокола проверки развернутых ответов в печатной или в электронной форме.

■ Протокол проверки развернутых ответов



Регион 99	Код предмета 2	Название предмета Математика (дата экзамена)	Номер протокола 1000001
ФИО эксперта Фамилия И.О.			Код эксперта 000002
Примечание			

Образец заполнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X

№	Код бланка	Позиции оценивания																									
		20	21	22	23	24	25																				
1	2920800339595																										
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											

■ Дата проверки  -  -

■ Подпись эксперта

Рис. 1. Вариант бланка протокола проверки развернутых ответов.

## Примеры решений, оцененных отдельными экспертами не в соответствии с критериями

**Пример 1.** Баржа прошла против течения реки 24 км и, повернув обратно, прошла ещё 32 км, затратив на весь путь 4 часа. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч.

Решение показано на рис. 2.

№21.

Пусть  $x \text{ км/ч}$  - собственная скорость баржи, тогда  $(x+5) \text{ км/ч}$  - скорость баржи по течению и  $(x-5) \text{ км/ч}$  - скорость баржи против течения.  $x \geq 0$

Составим и решим уравнение:

$$\frac{24}{x-5} + \frac{32}{x+5} = 4$$

$$\frac{24x + 120 + 32x - 160}{(x-5)(x+5)} = 4$$

$$\frac{56x - 40}{x^2 - 25} = 4 \frac{4}{1}$$

$$4(x^2 - 25) = 56x - 40$$

$$4x^2 - 100 - 56x + 40 = 0$$

$$4x^2 - 56x - 60 = 0 \quad | :4$$

$$x^2 - 14x - 15 = 0$$

$$a = 1; b = -14; c = -15$$

$$D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-14)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 196 + 60 = 256$$

$$\sqrt{D} = \sqrt{256} = 16$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{14 + 16}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15 \text{ км/ч}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{14 - 16}{2 \cdot 1} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ км/ч} \quad (\text{не подходит, так как скорость не может быть отрицательной и } x \geq 0)$$

Ответ: 15 км/ч.

Рис. 2.

Решение полное и верное. Критерии диктуют оценку 2 балла. Однако отдельные эксперты поставили 0 баллов. Во время апелляции эксперт мотивировал это тем, что в решении не описаны «самые «крупные» члены уравнения». Тем самым, необоснованно расширены критерии оценивания; эксперт, вероятно, опирался на собственный методический опыт, к тому же использовал туманный термин «крупные члены уравнения».

Также ряд экспертов указывают, что отсутствуют ограничения на знаменатель дроби. Но и это не является основанием считать, что задача решена некорректно: явно указано, что множители, из которых состоит произведение в знаменателе, – это скорости, и что скорость баржи не может быть равна скорости течения реки . При этом

ненужная запись  $x \geq 0$  не делает решение неверным. В данном случае переход от дробно-рационального уравнения к квадратному корректный, с учетом естественных ограничений условия задачи.

**Пример 2.** Автомобиль двигался с постоянной скоростью из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми 720 км. Другой автомобиль двигался с постоянной скоростью, которая была на 30 км/ч больше, чем скорость первого автомобиля, и приехал в Б на 4 часа раньше первого автомобиля. Найдите скорость второго автомобиля.

21.	$x > 0$	$S(\text{км})$	$V(\text{км}/\text{ч})$	$t(\text{ч})$
I	720	$x+30$	$\frac{720}{x+30}$	
II	720	$x$	$\frac{720}{x}$	на 4 ч.

Пусть  $x(\text{км}/\text{ч})$  - скорость II автомобиля, тогда  $x+30$  ( $\text{км}/\text{ч}$ ) - скорость I автомобиля. Составим и решим уравнение.

$$\frac{720}{x} - \frac{720}{x+30} = 4 \quad | : 4$$

$$\frac{180}{x} - \frac{180}{x+30} = 1 \quad | \cdot x(x+30)$$

$$180(x+30) - 180x = x(x+30)$$

См. доп. бланк 1 б.

$$180x + 180 \cdot 30 - 180x = x^2 + 30x$$

$$a=1 \quad x^2 + 30x - 5400 = 0$$

$$b=30 \quad D=b^2-4ac$$

$$c=-5400 \quad D=30^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-5400) = 900 + 21600 = 22500 = 150^2$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-30 + 150}{2 \cdot 1} = \frac{120}{2} = 60 \quad x_2 = \frac{-30 - 150}{2 \cdot 1} = \frac{-180}{2} = -90 - \text{не удовл.} *$$

$x = 60 (\text{км}/\text{ч})$  - скорость II автомобиля.

$60 + 30 = 90 (\text{км}/\text{ч})$  - скорость I автомобиля.

Ответ: 90  $\text{км}/\text{ч}$ .

Рис. 3.

Решение, приведенное на рис. 3, понятное, верное и завершенное. Решая квадратное уравнение, участник экзамена на полях допускает ошибку  $c = 5400$ . Однако в следующей строке используется число  $-5400$ . Выставлен 1 балл. Возможная мотивация (помимо отсутствия знака «минус»), вероятно, связана с тем, что отсутствует указание на условие  $x(x+30) \neq 0$ , что в данном случае следует из естественных ограничений условия задачи. Оценка, в соответствии с критериями, 2 балла.

**Пример 3.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 15$  и  $CH = 2$ . Найдите высоту ромба.

N 23

Дано:  $ABCD$  – ромб  
 $AH \perp CD$   
 $CH = 2$  см  
 $DH = 15$  см

Найти:  $AH$

Решение:

$DH = 15 + 2 = 17$  см  $\Rightarrow AD = DC = 17$  см

Рассмотрим  $\triangle AHD$ :  $\angle AHD = 90^\circ$

По теореме Пифагора вычислим  $AH$ :

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} \Leftrightarrow AH = \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8 \text{ см}$$

Ответ:  $AH = 8$  см.

Рис. 4.

Решение показано на рис. 4. Эксперт поставил 0 баллов.. Возможно, потому, что длины сторон указаны в сантиметрах, хотя в условии их нет. Другая версия: использована не теорема Пифагора в формулировке учебника, а эквивалентное ей утверждение. Также, отдельные эксперты снижают оценку за явно неудачный чертеж. Напомним, что в экзаменационной работе чертеж является лишь иллюстрацией к решению геометрической задачи, качество его построения не оценивается. Критерии в таком случае требуют оценку 2 балла.

**Пример 4.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 6 = 0$ .

N 20

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 6 = 0$$

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 6^2 = 0$$

$$1 - x - 6x^2 = 0 \quad , \quad \text{ОДЗ: } x \neq 0$$

$$-6x^2 - x + 1 = 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$6x^2 + x - 1 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 1 + 4 \cdot 6 = 1 + 24 = 25 = 5^2$$

$$x_1 = \frac{-1 + 5}{2 \cdot 6} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$x_2 = \frac{-1 - 5}{2 \cdot 6} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

Ответ:  $-0,5; \frac{1}{3}$

Рис. 5.

Эксперты поставили 1 балл за решение, показанное на рис. 5. Критерии обязывают выставить 2 балла, поскольку в решении нет ни ошибки, ни неточностей.

**Пример 5.** В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 16, а гипотенуза равна 34. Найдите высоту этого треугольника, проведенную к гипотенузе.

Решение дано на рис. 6. Двумя экспертами были выставлены оценки 1 и 0 баллов. Возможно из-за отсутствия указания, что гипотенузой является сторона  $AB$ , хотя это прямо следует из описания условия в рубрике «Дано», или из-за прямого перехода от квадрата длины  $BC$  к самой длине. Критерии оценивания однозначно предписывают поставить 2 балла.

№ 23.

<p>Дано:</p> <p><math>\triangle ABC</math> - прямой.  <math>AC = 16</math>  <math>AB = 34</math>  <math>CH</math> - высота</p> <p>Найти:  <math>CH</math> ?</p>	<p>Решение:</p> <p>1) Найдем <math>BC</math> по т. Пифагора</p> $AB^2 = BC^2 + AC^2$ $BC^2 = AB^2 - AC^2$ $BC^2 = 34^2 - 16^2$ $BC = 30$ <p>2) <math>S_{ABC} = AC \cdot BC \cdot \frac{1}{2}</math></p> $S_{ABC} = 16 \cdot 30 \cdot \frac{1}{2}$ $S_{ABC} = 240$ <p>3) <math>S_{ABC} = CH \cdot AB \cdot \frac{1}{2}</math></p> <p>Найдем высоту через формулу площади треугольника.</p> $240 = CH \cdot 34 \cdot \frac{1}{2}$ $240 = CH \cdot 17$ $CH = \frac{240}{17}$ $CH = 14\frac{2}{17}$ <p>Ответ: <math>CH = 14\frac{2}{17}</math></p>	
---	--	--

Рис. 6.

**Пример 6.** Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 4x + 7, & \text{при } x \geq -4, \\ -\frac{16}{x}, & \text{при } x < -4. \end{cases}$$

При каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  имеет ровно одну общую точку с графиком функции?




Рис. 7.

Оценка экспертов – 0 баллов (рис. 7). Участник подал апелляцию, однако она не была удовлетворена с формулировкой «не указано название графика парабола/гипербола». Налицо субъективное расширение критериев. Указание на вид графика элементарной функции не требуется в условии задачи. Оно, разумеется, может быть использовано при построении, например, «графиком является такая-то парабола (или ее часть)», без таблицы значений. Но, в данном случае, явное название желательно, но не обязательно.

В решении нет ошибок, обе части графика построены верно, продемонстрировано понимание алгоритмов построения гиперболы и параболы, показаны области, где расположены все нужные прямые вида  $y = m$ , границы промежутков, в которых

находятся нужные значения параметра, считаются однозначно из таблиц. Критерии диктуют оценку 2 балла.

**Пример 7.** Решите уравнение

$$\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0.$$

Представленное решение (рис. 8) получило оценку 0. Была подана апелляция. Апелляционная комиссия согласилась с оценкой 0 в связи с тем, что *региональной предметной комиссией было принято дополнительно соглашение*: при решении уравнения  $\frac{1}{x} = a$  должен быть использован алгоритм решения дробно-рациональных уравнения с обязательным указанием на условие  $x \neq 0$ . Неясно, почему комиссия не считает возможным пользоваться тем, что  $x$  и  $a$  взаимно обратны или хотя бы свойством пропорций. Приведенное решение математически корректное и полное. Оценка 2 балла.

№20

$$\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$$

Пусть  $\frac{1}{x} = t$ , тогда

$$t^2 - 3t - 4 = 0$$

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot (-4) = 25$$

$$t_1 = \frac{3+5}{2} = 4; t_2 = \frac{3-5}{2} = -1$$

$$x = \frac{1}{t_1} \quad -1 = \frac{1}{x}$$

$$x = \frac{1}{4} \quad x = -1$$

$$x = 0,25 \quad x = -1$$

**ОТВЕТ:** 0,25; -1

Рис. 8.

К сожалению, участившиеся случаи необоснованного снижения баллов за формально верные и корректные решения не только отталкивает школьников от математики, но и провоцирует в учительской среде подмену изучения математики натаскиванием на шаблоны решений и способы их оформления. Как следует из приведенных примеров, необоснованные требования подобного рода, которые, зачастую, невозможно предсказать, дезориентируют учащихся и учителей, смешая фокус внимания с важных математических рассуждений на придирики к оформлению верных решений.

Главной задачей эксперта должно быть отличить математически верное решение от неверного и выставить балл в соответствии с официальными критериями.

## **Часть 2. Примеры оценивания решений заданий 20 – 25 с краткими комментариями**

### **Задание 20**

Решите уравнение  $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$ .

*Решение.* Пусть  $t = \frac{1}{x-1}$ . Уравнение принимает вид

$$t^2 + 3t - 10 = 0,$$

откуда  $t_1 = -5$  и  $t_2 = 2$ .

Из уравнения  $\frac{1}{x-1} = -5$  получаем:  $x-1 = -\frac{1}{5}$ , откуда  $x = \frac{4}{5}$ .

Из уравнения  $\frac{1}{x-1} = 2$  получаем:  $x-1 = \frac{1}{2}$ , откуда  $x = \frac{3}{2}$ .

Ответ: 0,8; 1,5.

*Комментарий.* Другой способ состоит в приведении уравнения к системе

$$\begin{cases} x^2 - 2,3x + 1,2 = 0, \\ x \neq 1. \end{cases}$$

### **Критерии оценивания выполнения задания 20**

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

## Примеры оценивания решения задания 20

**Пример 1.** Решите уравнение  $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$ .

Ответ: 1,5; 0,8.

20.  $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$

1) Пусть  $(x-1) = t$ , тогда

$$\frac{1}{t^2} + \frac{3}{t} - 10 = 0$$

$$\frac{1 + 3t - 10t^2}{t^2} = 0 \quad t^2 \neq 0$$

$$1 + 3t - 10t^2 = 0$$

$$\Rightarrow -10t^2 + 3t + 1 = 0 \quad |(-1)$$

$$10t^2 - 3t - 1 = 0$$

$$D = 9 + 4 \cdot 1 \cdot 10 = 49$$

$$\sqrt{D} = 7$$

$$t_1 = \frac{3+7}{20} = 0,5$$

$$t_2 = \frac{3-7}{20} = -\frac{1}{5} = -0,2$$

Ответ:  $-0,2$  и  $0,8$ .

2)  $(x-1) = t$ , следовательно:

- $x-1 = 0,5$
- $x = 1,5$
- $x-1 = -0,2$
- $x = 1 - 0,2 = 0,8$

**Комментарий.** Все этапы решения присутствуют, корни найдены верно. Вынесенные в ответ значения содержат описку (вынесено в ответ одно из значений  $t$ ), которая не должна повлиять на оценку.

**Оценка 2 балла.**

**Пример 2.** Решите уравнение  $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$ .

Ответ: 1,5; 0,8.

$$\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0 ; \quad \frac{1}{(x-1)(x-1)} + \frac{3(x-1)}{(x-1)(x-1)} - \frac{10(x-1)(x-1)}{(x-1)(x-1)} = 0 ;$$

$$1 + 3(x-1) - 10(x-1)(x-1) = 0 , \text{ если } x \neq 1$$

$$1 + 3x - 3 - 10(x-1)^2 = 0 ;$$

$$-2 + 3x - 10x^2 + 20x - 10 = 0 ;$$

$$-10x^2 + 23x - 12 = 0 | :(-1) ;$$

$$10x^2 - 23x + 12 = 0 ;$$

$$\mathcal{D} = b^2 - 4ac ; \quad \mathcal{D} = 529 - 4 \cdot 10 \cdot 12 = 529 - 480 = 49$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\mathcal{D}}}{2a} = \frac{23 + 7}{2 \cdot 10} = \frac{30}{20} = 3,6 ; \quad x_2 = \frac{23 - 7}{20} = -\frac{26}{20} = -1 \frac{6}{20} = \cancel{-1,3} \overset{(5)}{=} -1,3$$

Ответ: -1,3 ; 3,6

**Комментарий.** В формуле корней квадратного уравнения допущена ошибка: не извлечен корень из дискриминанта. Учитывая, что имеется запись  $\sqrt{D}$ , допущенную ошибку можно приравнять к вычислительной.

**Оценка 1 балл**

**Пример 3.** Решите уравнение  $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$ .

Ответ: 1,5; 0,8.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{x-1}{x-1} - \frac{(x-1)^2}{10} = 0 \quad N=20 \\ & 1 + 3(x-1) - 10(x-1)^2 = 0 \quad O.D. 3. \\ & 1 + 3x - 3 - 10(x^2 - 2x + 1) = 0 \quad (x-1)^2 \neq 0 \\ & 1 + 3x - 3 - 10x^2 + 20x - 10 = 0 \quad x-1 \neq 0 \\ & -10x^2 + 23x - 12 = 0 \quad x \neq 1 \\ & D = b^2 - 4ac, \quad D = 529 - 480 = 49 = \pm 7^2 \\ & x_1 = \frac{-23+7}{-20} = \cancel{-}1,5 \quad x_2 = \frac{23-7}{-20} = \frac{16}{-20} = \cancel{-}\frac{4}{5} \\ & \text{Ответ: } \cancel{-}1,5; \quad 0,8 \end{aligned}$$

**Комментарий.** Имеются ошибки в вычислении корней квадратного уравнения и ошибка в знаке при делении чисел с разными знаками.

**Оценка 0 баллов.**

## Задание 21

Два велосипедиста одновременно отправляются в 112-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 9 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

**Решение.** Пусть скорость второго велосипедиста равна  $x$  км/ч. Тогда  $x+9$  км/ч — скорость первого. Первый велосипедист проехал 112 км за  $\frac{112}{x+9}$  часов, а второй —

за  $\frac{112}{x}$  часов. По условию время, затраченное первым велосипедистом на весь путь, на 4 часа меньше времени второго. Составим уравнение

$$\frac{112}{x} - \frac{112}{x+9} = 4.$$

Это уравнение приводится к квадратному  $x^2 + 9x - 252 = 0$ , корнями которого являются числа 12 и  $-21$ . Отрицательный корень посторонний.

Ответ: 12 км/ч.

### Критерии оценивания выполнения задания 21

Содержание критерия	Баллы
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Ход решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена арифметическая ошибка	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

## Примеры оценивания решения задания 21

**Пример 1.** Два велосипедиста одновременно отправляются в 112-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 9 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Ответ: 12 км/ч.

	S	t	V
1 вел.	112	$\frac{112}{x}$	x
2 вел.	112	$\frac{112}{x-9}$	x-9

$\frac{112}{x-9} = \frac{112}{x} + 4$  (т.к. первый вел. прибыл на 4 ч раньше)

$$\frac{112}{x-9} = \frac{112}{x} + 4 \quad | \cdot x$$

$$\frac{112x}{x-9} = 112 + 4x$$

$$\frac{112x}{x-9} = 112 + 4x \quad | \cdot (x-9)$$

$$112x = 112x - 1008 + 4x^2 - 36x$$

$$112x - 1008 + 4x^2 - 36x - 112x = 0$$

$$4x^2 - 36x - 1008 = 0$$

$$D = 1296 - 4 \cdot 4 \cdot 1008 = 17424$$
  

$$x_1 = \frac{36 + \sqrt{17424}}{8} = 21$$

$$x_2 = \frac{36 - \sqrt{17424}}{8} = -12$$

$x = 21$  (скорость первого вел.)

$x-9 = 21-9 = 12$  (скорость второго вел.)

Ответ: 12 км/ч

**Комментарий.** Задача решена верно.

**Оценка 2 балла.**

**Пример 2.** Два велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Ответ: 14 км/ч

Пусть скорость первого велосипедиста равна  $x$  км/ч. Тогда скорость второго велосипедиста равна  $(x-2)$  км/ч. Тогда время, за которое прибудет до финиша первый велосипедист, равно  $\frac{224}{x}$  ч. Тогда второй велосипедист прибудет до финиша за  $\frac{224}{(x-2)}$  ч. По условию задачи известно, что первый велосипедист прибывает к финишу на 2 часа раньше.

Составим и решим уравнение:

$$\frac{224}{x} - \frac{224}{x-2} = 2$$

$$\frac{x(x-2)}{x} \cdot \frac{224}{x} - \frac{x(x-2) \cdot 224}{x-2} = 2x(x-2)$$

$$224x - 224(x-2) = 2x(x-2)$$

$$224x - 224x + 448 = 2x^2 - 4x$$

$$-2x^2 + 4x + 448 \quad | :(-2)$$

$$x^2 - 2x - 224 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-224) = 4 + 896 = 900$$

$$x_1 = \frac{-(-2) + \sqrt{900}}{2 \cdot 1} = \frac{2 + 30}{2} = 16$$

$$x_2 = \frac{-(-2) - \sqrt{900}}{2 \cdot 1} = \frac{2 - 30}{2} = -\frac{28}{2} = -14$$

Условие задачи удовлетворяет  $x_1$ .

Ответ: 16 км/ч.

**Комментарий.** Задача решена верно. Однако на последнем этапе имеется ошибка: скорость второго велосипедиста не вычислена, и в ответе дана скорость первого велосипедиста вместо скорости второго.

Оценка 1 балл.

**Пример 3.** Два велосипедиста одновременно отправляются в 112-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 9 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Ответ: 12 км/ч

	$s$ (км)	$t$ (ч)	$\frac{v}{s}$ (км/ч)
1в.	112	$\frac{x}{x}$	$\frac{112}{x}$
2в.	112	$x - 9$	$\frac{112}{x-9}$

Пусть  $x$  - время (т) первого велосипедиста, тогда  
 $x - 9$  - время (т) второго велосипедиста. расстояние  
 $(s)$  - 112 км; Тогда чтобы найти скорость ( $v$ ) первого  
нужно:  $(s:t)$ :  $\frac{112}{x}$  км/ч; скорость ( $v$ ) второго:  $(s:t)$ :  
 $\frac{112}{x-9}$  км/ч. А первый вел. чёт на 4 часа больше, чем  
второй. Можно составить уравнение:

$$\frac{112}{x-9} - \frac{112}{x} = 4; \quad \frac{112}{x-9} - \frac{112}{x} - \frac{4(x^2 - 9x)}{x(x-9)} = 0;$$

$$\frac{112x - 112x + 1008 - 4x^2 + 36x}{x(x-9)} = 0; \quad \frac{1008 - 4x^2 + 36x}{x(x-9)} = 0;$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1008 - 4x^2 + 36x = 0, \\ x(x-9) \neq 0; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 1008 - 4x^2 + 36x = 0, \\ x \neq 0; x \neq 9; \end{array} \right.$$

$$1008 - 4x^2 + 36x = 4x^2 - 36x - 1008 = x^2 - 9x - 252 = 0;$$

$$4x^2 - 36x - 1008 = 0 \quad | : 4; \quad x^2 - 9x - 252 = 0$$

$$x^2 - 9x - 252 = 0; \quad D = b^2 - 4ac;$$

$$D = 81 + 252 \cdot 4 = 81 + 1008 = 1089;$$

$$x_1 = \frac{9+33}{2} = \frac{42}{2} = 21; \quad x_2 = \frac{9-33}{2} = -\frac{24}{2} = -12;$$

По условию задачи подходит 21 км/ч, т.к.  $v$ -скорость не может быть отрицательной.

Ответ: 21 км/ч - скорость второго.

**Комментарий.** В описании переменных многочисленные логические ошибки, в результате уравнение составлено неверно.

**Оценка 0 баллов.**

## Задание 22

Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

**Решение.** Функция не определена при

$$x = 0, x = \pm \frac{2}{3}.$$

При  $x > 0$  и  $x \neq \frac{2}{3}$  получаем  $y = \frac{1,5x-1}{x-1,5x^2} = -\frac{1}{x}$ .


При  $x < 0$  и  $x \neq -\frac{2}{3}$  получаем  $y = \frac{-1,5x-1}{-x-1,5x^2} = \frac{1}{x}$ .

График функции состоит из частей двух гипербол, из которых выколоты точки

$$\left(-\frac{2}{3}; -\frac{3}{2}\right) \text{ и } \left(\frac{2}{3}; -\frac{3}{2}\right).$$

Прямая  $y = kx$  не пересекает график, если она горизонтальна или если она проходит через одну из выколотых точек, то есть если  $k = \pm \frac{9}{4}$ .

**Ответ:**  $0, -\frac{9}{4}, \frac{9}{4}$ .



### Критерии оценивания выполнения задания 22

Содержание критерия	Баллы
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

## Примеры оценивания решения задания 22

**Пример 1.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.


$$\text{н.22) } y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$$

1) если  $x \geq 0$ , то

$$y = \frac{1,5x-1}{1-1,5x^2} = \frac{1,5x-1}{-x(1,5x-1)} = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}, \text{ где } x \neq \frac{2}{3} \text{ и } y \neq -\frac{3}{2}$$

2) если  $x < 0$ , то

$$y = \frac{-1,5x-1}{-x-1,5x^2} = \frac{-1,5x-1}{x(-1,5x-1)} = \frac{1}{x}, \text{ где } x \neq -\frac{2}{3} \text{ и } y \neq -\frac{3}{2}$$



$y = kx$  не будет иметь общих точек с графиком если  $y = 0$  ( $\Rightarrow k = 0$ ) то есть  $k = 0$  или если он будет проходить через боковые точки  $(\frac{2}{3}, -\frac{3}{2})$  и  $(-\frac{2}{3}, -\frac{3}{2})$ .

$$-\frac{3}{2} = k \cdot \frac{2}{3}$$

$$-\frac{3}{2} = -\frac{2}{3}k$$

$$k = -\frac{9}{4} \neq$$

$$k = \frac{9}{4}$$

$$k = -2,25$$


$$k = 2,25$$

Однако  $k = -2,25; 0; 2,25$ .

**Комментарий.** Решение полное и верное.

**Оценка 2 балла.**

**Пример 2.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.



**Комментарий.** График построен верно, верно найдены два из трех значений  $k$ .

**Оценка 1 балл.**

**Пример 3.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

$$22. \quad y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2} \quad \text{при } x \neq 0$$

$$x > 0 \text{ и } x \neq 0$$

$$x < 0$$

$$y = \frac{1,5x-1}{x-1,5x^2}$$

$$y = \frac{-1(1,5x+1)}{x(1,5x+1)}$$

$$y = -\frac{1}{x}$$

$$y = \frac{-1,5x-1}{-x-1,5x^2}$$

$$y = \frac{1(1,5x+1)}{-x(1,5x+1)}$$

$$y = \frac{1}{x}$$

1) Построим график функции  $y = -\frac{1}{x}$

при  $x \geq 0$ , и  $x \neq 0$

$$y = -\frac{1}{x}, \text{ гипербола.}$$


$x$	0	1	2	4	0,5
$y$	—	-1	-0,5	-0,25	-2

2) Построим график функции

$$y = \frac{1}{x} \text{ при } x < 0 \text{ и } x \neq 0$$

$x$	-1	-2	-0,5	-4
$y$	-1	-0,5	-2	-0,25

Построим оба графика на одной координатной плоскости.



Строим  $y = kx$   
не имеет с графиком  
общих точек при  $k \neq 0$ .

Ответ: 0.


**Комментарий.** График построен с ошибкой: не выколоты точки, в которых функция не определена.

**Оценка 0 баллов.**

### Задание 23

Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

*Решение.*



$ABCD$  — ромб, поэтому  $AD = DC = DH + HC = 29$ . Из треугольника  $ADH$  находим:

$$AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = 20.$$

Ответ: 20.

### Критерии оценивания выполнения задания 23

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные объяснения или допущена одна вычислительная ошибка	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

### Примеры оценивания решения задания 23

**Пример 1.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 20.

задание 23

Дано:  $ABCD$  - ромб  
 $AH$  - высота  
 $CH = 8$   
 $DH = 21$

Найти:  $h_{ABCD}$

Решение:

- 1)  $DC = AD = AB = BC = 29$  (т.к. у ромба все стороны равны)
- 2)  $\triangle ADH$ . По Т. Пифагора:  
 $AH^2 = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{841 - 441} = \sqrt{400} = 20$


Ответ: 20 см

**Комментарий.** Решение полное и верное.

**Оценка 2 балла.**

**Пример 2.** Высота, опущенная из вершины ромба, делит противоположную сторону на отрезки равные 24 и 2, считая от вершины острого угла. Вычислите длину высоты ромба.

Ответ: 10.

 <p>Дано:</p> <p>ABCD - ромб AH - высота <math>CH = 2</math> <math>DH = 24</math> <math>AH = ?</math></p>	<p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) т.к. ромб стороны равны <math>CD = AD = CH + DH</math> <math>AD = 26</math></li> <li>2) <math>AH = \sqrt{AD^2 - DH^2}</math> (по теореме Пифагора на <math>\triangle AHD</math>)  <math>AH = \sqrt{676 - 576} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}</math></li> </ol> <p>Отв: <math>10\sqrt{2}</math></p>
--	---

**Комментарий.** Вычислительная ошибка при нахождении разности под знаком корня.

**Оценка 1 балл.**

**Пример 3.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 20.

23.

Дано:

$ABCD$  — ромб

$AH$  — высота

$DH = 21$

$CH = 8$

Найти:

$AH = ?$

Решение:

~~По свойству ромба, высота делит противоположную сторону~~

~~$\angle A$  на  $\angle H \Rightarrow AH =$~~

$\Rightarrow AD = DH + HC = 21 + 8 = 29$  (~~по свойству противоположные стороны~~).

Таким образом  $\triangle ADH$ :


$\triangle \angle H$  — прямой  $\Rightarrow \triangle ADH$  — прямой

По теореме Пифагора:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2$$

$$AH = \sqrt{841 - 441} = \sqrt{400} = 20$$

Ответ:  $AH = 20$




**Комментарий.** Ответ верный, однако, решение содержит геометрическую ошибку: сторона  $AD$  не складывается из отрезков  $DH$  и  $HC$ . Рисунок не соответствует решению.

**Оценка 0 баллов.**

### Задание 24

Окружности с центрами в точках  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , причём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону от прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

*Доказательство.* Точка  $E$  равноудалена от точек  $C$  и  $D$ , поэтому эта точка лежит на серединном перпендикуляре к отрезку  $CD$ . Аналогично, точка  $F$  лежит на серединном перпендикуляре к отрезку  $CD$ . Значит, прямая  $EF$  является серединным перпендикуляром к отрезку  $CD$ .




#### Критерии оценивания выполнения задания 24

Содержание критерия	Баллы
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит неточности	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	<b>2</b>

## Примеры оценивания решения задания 24

**Пример 1.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , причём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону от прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

24.



Дано:  $CD$ -прямая,  $(.)C$  и  $(.)D$ -пересечение двух окружностей

Показать:  $CD \perp EF$

Доказательство.

1)  $EC = ED$ -радиусы

$FC = FD$ -радиусы

2)  $(.)E$  и  $(.)F$  равноудалены от концов отрезка  $CD$

$\Rightarrow EF$ -срединный перпендикуляр  $\Rightarrow CD \perp EF$

Ч.т.д.

**Комментарий.** Доказательство понятное, полное и верное.

**Оценка 2 балла.**

**Пример 2.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , причём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону от прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

24.

Вано: две окружности с центрами  $E$  и  $F$ , пересекающиеся в точках  $C$  и  $D$ .  
Вспомог.:  $CD \perp EF$

Вокруготельство: пусть  $K$  центр  $CD$ .  
Рассмотрим  $\triangle ECD$ :  
 $EC = ED$ , как радиусы окружности, тогда  
 $\triangle ECD$  - равнобедренный, следовательно  $EK$  будет  
высотой.

Рассмотрим  $\triangle CFD$ :  
 $FC = FD$ , как радиусы окружности, тогда  $\triangle CFD$  - равнобедренный.  
и медиана  $FK$  будет высотой.

Высоты  $EK$  и  $FK$  перпендикулярны точке  $K$  под прямым углом и опираются на одну дугу. Т.е.  $EK$  и  $FK$  соположены и являются перпендикулярами к стороне  $CD$  и, следовательно  $EF \perp CD$ . Что и требовалось доказать.

**Комментарий.** В последнем абзаце содержатся лишенные смысла утверждения «высоты пересекают точку под прямым углом», «высоты опираются на одну дугу». Имеется в виду, что оба отрезка  $EF$  и  $FK$  перпендикулярны  $CD$ , и это доказано выше. Поскольку рассуждение, в целом, понятное и верное, эти недостатки можно отнести к несущественным неточностям.

**Оценка 1 балл.**


**Пример 3.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , причём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону от прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

*Dано:*

окр ( $E$ ); окр ( $F$ )

окр ( $E$ )  $\cap$  окр ( $F$ ) =  $C \cup D$

Док-ть:  $CD \perp EF$



*Решение. Доказательство*

Проведём  $EC$  и  $ED$  — радиусы, тогда  $EC = ED$ .

$\triangle ECD$  — равнобедренный, т.к.  $EC = ED$  (как радиусы)  $\Rightarrow \angle EDC = \angle ECD$ ,

$CK = KD \Rightarrow \angle EKC = \angle EKD$  (по 2 сторонам и углу между ними).

Тогда  $\angle CEK = \angle DEK \Rightarrow EK$  — биссектриса  $\angle CED$ . В равнобедренной треугольнике биссектриса, выущенная из вершины, является медианой и высотой  $\Rightarrow EF \perp CD$  2. м. г.

**Комментарий.** Не доказано, что  $CK = KD$ , не доказано, что точка  $F$  лежит на высоте  $EK$ . Без этого рассуждение не является достаточным.

**Оценка 0 баллов.**

### Задание 25

В треугольнике  $ABC$  биссектриса угла  $A$ , делит высоту, проведённую из вершины  $B$ , в отношении  $25:24$ , считая от точки  $B$ . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , если  $BC=14$ .

**Решение.** Пусть биссектриса, проведенная из угла  $A$ , пересекает высоту  $BH$  в точке  $O$  (см. рис.). Пользуясь свойством биссектрисы, из треугольника  $ABH$  находим:

$$\frac{BA}{AH} = \frac{BO}{OH} = \frac{25}{24}.$$

Следовательно,

$$\cos A = \frac{AH}{AB} = \frac{24}{25}.$$


Тогда

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{24}{25}\right)^2} = \frac{7}{25}.$$

По теореме синусов из треугольника  $ABC$  находим:

$$\frac{BC}{2\sin A} = \frac{14 \cdot 25}{2 \cdot 7} = 25.$$

Ответ: 25.



#### Критерии оценивания выполнения задания 25

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Ход решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена ошибка вычислительного характера	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

## Примеры оценивания решения задания 25

**Пример 1.** В треугольнике  $ABC$  биссектриса угла  $A$  делит высоту, проведенную из вершины  $B$ , в отношении  $25:24$ , считая от точки  $B$ . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , если  $BC = 14$ .

Ответ: 25.

Решение:

$\frac{AM}{MH} = \frac{24}{25}$

$BH = 25$

$BC = 14$

Искомое:  
 $R$

Решение:

$\cancel{AH}$  - биссектриса (по условию)

$\frac{AM}{AB} = \frac{MH}{BH} = \frac{24}{25}$

Пусть  $AM = 24y$ , тогда  
 $AB = 25y$

$MB = \frac{7}{25}y$  (по толчение параллель)

$\sin \angle A = \frac{7}{25}$

$2R = \frac{CB}{\sin \angle A} = \frac{14}{\frac{7}{25}} = 50$

$R = \frac{50}{2}$

Ответ: 25.


**Комментарий.** Решение полное и верное.

**Оценка 2 балла.**

**Пример 2.** В треугольнике  $ABC$  биссектриса угла  $A$  делит высоту, проведённую из вершины  $B$ , в отношении  $25:24$ , считая от точки  $B$ . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , если  $BC = 14$ .

Ответ: 25.

$$\begin{aligned} \text{дано:} \\ \triangle ABC \\ BH - \text{высота} \\ AO - \text{биссектриса} \\ BC = 14 \\ BO : OH = 25x : 24x \\ R - ? \end{aligned}$$



$$\text{Решение: } 1) \frac{AB}{AH} = \frac{BO}{OH} = \frac{24y}{25x} \text{ - соотношение в } \triangle ABH$$

$$\begin{aligned} 2) \triangle ABH - \text{треугольник} \Rightarrow \\ 25y^2 = AB^2 = AH^2 + BH^2 \text{ (Пифагор)} \Rightarrow \\ 25y^2 = 24y^2 + (7x)^2 \Rightarrow 4y^2 = (7x)^2 \Rightarrow y^2 = 49x^2 \Rightarrow y = 7x \\ 3) \sin \angle BAH = \frac{BH}{AB} = \frac{7x}{25x} = \frac{7}{25} \\ = \frac{\frac{49x^2}{25}}{2R} = \frac{7}{25} \quad \text{следствие из теоремы синусов} \Rightarrow \\ \frac{7}{25} = \frac{14}{2R} \Rightarrow 2R = 50 \Rightarrow R = 25 \end{aligned}$$

**Комментарий.** Ход решения понятен, все шаги присутствуют, но допущена математическая ошибка: при возведении в квадрат выражений  $25y$  и  $24y$  коэффициенты остались без изменения.

**Оценка 0 баллов.**

**Пример 3.** В треугольнике  $ABC$  биссектриса угла  $A$  делит высоту, проведённую из вершины  $B$ , в отношении  $25:24$ , считая от точки  $B$ . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , если  $BC = 14$ .

Ответ: 25.

Решение

Дано

- $ABC$
- AM - биссектриса
- BN - высота
- $BK : KN = 25 : 24$
- $BC = 14$

$R - ?$

1)  $\angle BKM$  опирается на ту же дугу, что и  $\angle BAM$ , значит  $\angle BKM = \angle BAM$

2)  $\angle BKM = \angle AKH$ , ~~так как вертикальные~~  
 $\angle BKM = \angle BAN = \angle MAC$  ~~ноч учишь~~

3) Рассмотрим  $\triangle AKH$ :  
 $\angle AHB = 90^\circ$  - прямой, так  $BN$  - биссектриса к  $AC$ .  
 $\angle KAH = \angle CAK$  (по ②.),  $75^\circ$   
 $\angle KAC = 45^\circ$

4)  $\angle BAC = \angle BAM + \angle MAC$   
 $\angle MAC = 45^\circ = \angle BAM$ ,  $75^\circ$   
 $\angle BAC = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$   
 $\angle BAC = 90^\circ$ ,  $75^\circ$   
 $BC = d = 2R = 14$   
 $R = 7$

Ответ: 7

**Комментарий.** Свойство вписанных углов применяется к углу  $BKM$ , который не является вписанным. Это геометрическая ошибка.

**Оценка 0 баллов.**

### ЧАСТЬ 3 Материалы для практических занятий

Оцените решения, данные в упражнениях. Комментарии и ответы в конце части.

#### Задание 20

**Упражнение 20.1.** Решите уравнение  $(x-2)(x^2+6x+9)=6(x+3)$ .

Ответ:  $-4, -3, 3$ .

$$\begin{aligned} \text{N20 } & (x-2)(x^2+6x+9)=6(x+3) \\ & (x-2)(x+3)^2-6(x+3)=0 \\ & (x+3)((x-2)/(x+3)-6)=0 \\ & x=-3 \quad \text{и} \quad x^2+3x-2x-6-6=0 \\ & x^2+x-12=0 \\ & a=1 \quad \left| \begin{array}{l} D=1+48=49 \\ D>0, 2 \text{ корня} \end{array} \right. \\ & b=1 \\ & c=-12 \quad \left| \begin{array}{l} x_1 = \frac{-1-7}{2} = \frac{-8}{2} = -4 \\ x_2 = \frac{-1+7}{2} = \frac{6}{2} = 3 \end{array} \right. \\ & \text{Ответ: } -4; 3 \end{aligned}$$

**Упражнение 20.2.** Решите уравнение  $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$ .

Ответ:  $-4, -1, 1$ .

решение

$$x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$$
$$x^2(x+4) - 1 \cdot (x+4)$$
$$(x+4)(x^2-1) = 0$$
$$x^2 - 1 = 0$$
$$x_1 = -1$$
$$x_2 = 1$$
$$x_3 = -4$$

Ответ:  $-4; 1; -1$

**Упражнение 20.3.** Решите уравнение  $x^2 - 3x + \sqrt{6-x} = \sqrt{6-x} + 40$ .

Ответ:  $-5$ .

20.

$$\begin{aligned} x^2 - 3x + \sqrt{6-x} &= \sqrt{6-x} + 40 \\ x^2 - 3x + \cancel{\sqrt{6-x}} - \cancel{\sqrt{6-x}} - 40 &= 0 \\ x^2 - 3x - 40 &= 0 \\ D = b^2 - 4ac &= (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-40) = 9 + 160 = 169 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D > 0 \Rightarrow 2 \text{ корня} \\ x_1 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{169}}{2 \cdot 1} = \frac{3 + 13}{2} = \frac{16}{2} = 8 \\ x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{169}}{2 \cdot 1} = \frac{3 - 13}{2} = \frac{-10}{2} = -5. \end{aligned}$$

Ответ:  $-5 ; 8$ .

**Упражнение 20.4.** Решите уравнение  $(x - 2) \cdot (x^2 + 2x + 1) = 4(x + 1)$ .

Ответ:  $-2, -1, 3$ .

2"326000"650518" Условия задания переписывать не нужно

№ 20

$$(x-2)(x^2+2x+1) = 4(x+1) \quad (x-2)(x+1)^2 = 4(x+1) = 0$$
$$(x-2)(x^2+2x+1) - 4(x+1) = 0 \quad (x+1)((x-2)(x+1)-4) = 0$$
$$\cancel{x^3+2x^2+x-2x^2-4x-2-4x-4=0} \quad x+1=0 \quad \text{или} \quad (x-2)(x+1)-4=0$$
$$\cancel{x^3-7x-6=0} \quad x=-1 \quad x^2-x-6=0$$
$$\cancel{x^3-7x=6}$$
$$\cancel{x(x^2-1)=6}$$
$$x=6 \quad \text{или} \quad x^2-1=6$$
$$\cancel{x^2=13} \quad x=\sqrt{13} \quad \text{Ответ: } \sqrt{13}; 6 \quad \cancel{x^2-1=6} \quad \text{Ответ: } -1; 2; 3$$
$$D = 1 - 4(-6) = \sqrt{25} = 5$$
$$x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$$
$$x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$$

**Упражнение 20.5.** Решите уравнение  $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$ .

Ответ: 0,8, 1,5.

$$\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$$

$$\frac{1 + 3(x-1) - 10(x-1)^2}{(x-1)^2} = 0$$

$$\frac{1 + 3x - 3 - 10x^2 + 20x - 10}{(x-1)^2} = 0$$

$$\frac{-10x^2 + 23x - 12}{(x-1)^2} = 0$$

$$D = 23 \cdot 23 - 4 \cdot 10 \cdot 12 = 529 - 480 = 49$$

$$x_{1,2} = \frac{-23 \pm 7}{-20}$$

$$\text{Омблем: } x_1 = \frac{2}{3} \quad x_2 = \frac{4}{5}$$

**Упражнение 20.6.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$ .

Ответ:  $-0,2, 0,5$ .

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 &= 0 \quad | \cdot x^2 ; x \neq 0 \\ 1 + 3x - 10x^2 &= 0 \quad | \cdot (-1) \\ 10x^2 - 3x - 1 &= 0 \\ D &= b^2 - 4ac \\ D &= (-3)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-1) = 49 ; \sqrt{D} = \pm 7 \\ x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} ; x &= \frac{3 \pm 7}{2 \cdot 10} \\ x_1 &= \frac{3+7}{20} \\ x_1 &= 0,5 \\ x_2 &= \frac{3-7}{20} \\ x_2 &= -0,2 \\ \text{Ответ: } x_1 &= 0,5 ; x_2 = -0,2\end{aligned}$$

**Упражнение 20.7.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$ .

Ответ:  $-0,2, 0,5$ .

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$$

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3x}{x^2} - \frac{10x^2}{x^2} = 0 \quad x \neq 0$$

$$1 + 3x - 10x^2 = 0$$

$$-10x^2 + 3x + 1 = 0$$

$$D = 9 - 4 \cdot 1 \cdot (-10) = 9 + 40 = 49$$

$$\sqrt{D} = \pm 7$$

$$x_1 = \frac{-3 - 7}{-20} = \frac{-10}{-20} = 2$$

$$x_2 = \frac{-3 + 7}{-20} = \frac{4}{-20} = -0,2$$

$$\text{Ответ: } x_1 = 2, x_2 = -0,2$$

**Упражнение 20.8.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$ .

Ответ:  $-0,2, 0,5$ .

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0 \quad \text{ОДЗ: } x \neq 0$$

$$1 + 3x - 10x^2 = 0.$$

$$-10x^2 + 3x + 1 = 0 \quad : (-1).$$

$$x^2 + 3x + 1 = 0.$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4 \cdot (-1) \cdot 10 = 49.$$

$$x_1 = \frac{-3 + 7}{20} = 0,5.$$

$$x_2 = \frac{-3 - 7}{20} = -0,8.$$

Ответ:  $0,5; -0,8$ .

**Упражнение 20.9.** Решите уравнение  $(x - 2) \cdot (x^2 + 2x + 1) = 4(x + 1)$ .

Ответ:  $-2, -1, 3$ .

$$(x - 2)(x^2 + 2x + 1) = 4(x + 1)$$

$$(x^2 + 2x + 1) = (x + 1)^2$$

$$(x - 2)(x + 1)^2 - 4(x + 1) = 0$$

$$(x - 2)(x + 1)(x + 1) - 4(x + 1) = 0$$

$$(x + 1)((x - 2)(x + 1) - 4) = 0$$

$$x + 1 = 0$$

$$(x - 2)((x + 1) - 4) = 0$$

$$x = -1$$

$$x^2 - 2x + x - 2 = 0$$

$$x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$a = 1 \quad b = -3 \quad c = -2$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 9 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9 + 8 = 17$$

$D < 0$  корней нет

Ответ:  $-1$

**Упражнение 20.10.** Решите уравнение  $(x - 2) \cdot (x^2 + 2x + 1) = 4(x + 1)$ .

Ответ:  $-2, -1, 3$ .

$$\begin{aligned}(x-2)(x^2+2x+1) &= 4(x+1) \\(x-2)(x+1)^2 &= 4(x+1) \\(x-2)(x+1)(x+1) - 4(x+1) &= 0 \\(x+1)^2((x-2)-4) &= 0 \\(x+1)^2(x^2-2x+x-2-4) &= 0 \\(x+1)^2(x^2-x-6) &= 0 \\x^2+1=0 & \quad x^2-x-6=0 \\x^2=1 & \quad D=6^2-4\cdot(-6) \\x^2=-1 & \quad D=36+24 \\D=25 & \\x_1=\frac{1+5}{2}=\frac{6}{2}=3 & \\x_2=\frac{1+5}{2}=\frac{-4}{2}=-2 & \\\text{Ответ: } 1; -1; 3; -2 &\end{aligned}$$

**Упражнение 20.11.** Решите уравнение  $(x - 2) \cdot (x^2 + 2x + 1) = 4(x + 1)$ .

Ответ:  $-2, -1, 3$ .

$$\begin{aligned}(x-2)(x^2+2x+1) &= 4(x+1) \\(x-2)(x+1)^2 - 4(x+1) &= 0 \\(x-1)((x-2)(x+1) - 4) &= 0 \\x-1 = 0 \text{ или } (x-2)(x+1) - 4 &= 0 \\x = \cancel{-1} \quad x^2 + x - 2x - 2 - 4 &= 0 \\x^2 - x - 6 &= 0 \\D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) &= 1 + 24 = 25 = 5^2 \\x_1 = \frac{1+5}{2} &= \frac{6}{2} = 3 \\x_2 = \frac{1-5}{2} &= \frac{-4}{2} = -2\end{aligned}$$

Ответ:  $-2; 1; 3$

## Задание 21

**Упражнение 21.1.** Игорь и Паша могут покрасить забор за 20 часов, Паша и Володя – за 21 час, а Володя и Игорь за 28 часов. За какое время покрасят забор мальчики, работая втроем. Ответ дайте в минутах.

Ответ: 900 минут.

- 1) Пусть работа, которую нужно сделать во всех случаях равна 1.
- 2) Пусть производительность труда Игоря –  $x$ , Паша –  $y$ , а Володя –  $z$
- 3) Тогда! производительность труда Игоря и Паша  $= x+y = \frac{1}{20}$   
Паша и Володя –  $y+z = \frac{1}{21}$  (часы)  
Володя и Игорь –  $z+x = \frac{1}{28}$  (часы)
- 4) Решим систему уравнений:

$$\begin{cases} x+y = \frac{1}{20} \\ y+z = \frac{1}{21} \\ z+x = \frac{1}{28} \end{cases}$$

$$x+y = \frac{1}{20} - y$$

$$z = \frac{1}{21} - y$$

$$\frac{1}{20} - y + \frac{1}{21} - y = \frac{1}{28}$$

$$-2y = \frac{1}{28} - \frac{1}{20} - \frac{1}{21}$$

$$-2y = \frac{5 - 20 - 21}{420}$$

$$-2y = -\frac{36}{420}$$

$$y = \frac{13}{420}$$

$$x = \frac{1}{20} - \frac{13}{420}$$

$$x = \frac{21}{420} - \frac{13}{420}$$

$$x = \frac{8}{420}$$

$$z = \frac{1}{21} - \frac{13}{420}$$

$$z = \frac{20}{420} - \frac{13}{420}$$

$$z = \frac{7}{420}$$

- 5) Таким образом производительность всех мальчиков:

$$\frac{8}{420} + \frac{21}{420} + \frac{13}{420} = \frac{28}{420} = \frac{1}{6} \text{ час, а в минутах } \frac{28}{420 \cdot 60}$$

- 6) Время за которое они выполнат работу:

$$\text{т. } \frac{28}{420 \cdot 60} = \frac{420 \cdot 60}{28} = \frac{60 \cdot 60}{4} = 900 \text{ минут}$$

Ответ: за 900 минут мальчики покрасят забор, работая втроем.

**Упражнение 21.2.** Игорь и Паша могут покрасить забор за 14 часов, Паша и Володя – за 15 часов, а Володя и Игорь за 30 часов. За какое время покрасят забор мальчики, работая втроем. Ответ дайте в минутах.

Ответ: 700 минут.

$$\begin{aligned} H + P &= 14 \\ Y + P &= 15 \\ V + I &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} X + Y = \frac{1}{14} \\ Y + Z = \frac{1}{15} \\ Z + X = \frac{1}{30} \end{cases}$$

$$\begin{cases} X + Y = \frac{1}{14} \\ Y = \frac{1}{15} - Z \\ X = \frac{1}{30} - Z \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{15} - 2 + \frac{1}{30} - 2 &= \frac{1}{14} \\ -22 + \frac{3}{30} &= \frac{1}{14} \\ -22 &= \frac{1}{14} - \frac{3}{30} \\ -22 &= \frac{30 - 42}{420} \end{aligned}$$

$$2Z = \frac{12}{420}$$

$$Z = \frac{12}{420} : 2 = \frac{12}{420} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{70}$$

$$Y = \frac{1}{15} - \frac{1}{70} = \frac{70 - 15}{1050} = \frac{55}{1050}$$

$$X = \frac{1}{30} - \frac{1}{70} = \frac{70 - 30}{2100} = \frac{40}{2100} = \frac{4}{210}$$

$$\frac{1}{70} + \frac{55}{1050} + \frac{4}{210} = \frac{1}{210} + \frac{55}{1050} = \frac{1}{30} + \frac{55}{1050} = \frac{1050 + 1650}{31500} =$$

$$= \frac{2700}{31500} = \frac{27}{315} (\text{ч})$$

$$\frac{27}{315} \cdot \frac{60}{1} = \frac{1620}{315} = 5 \frac{45}{315} = 5 \frac{1}{7} (\text{минут})$$

Ответ:  $5 \frac{1}{7}$  (минут)

**Упражнение 21.3.** Два велосипедиста одновременно отправляются в 209-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 8 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 8 часов раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Ответ: 11 км/ч.

2||326000||346442||

Условия задания переписывать не нужно

21. Пусть  $x$  км/ч — скорость 2 велосипедиста, тогда  $(x+8)$  км/ч — скорость 1 велосипедиста, общее расстояние 209 км.

$\frac{209}{x}$  ч — время 2 велосипедиста

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-209) = 64 + 836 = \\ = 900 (D > 0)$$

$\frac{209}{x+8}$  ч — время 1 велосипедиста.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$\frac{209}{x} - \frac{209}{x+8} = 8^{(x(x+8))}$$

$$x_1 = \frac{-8 - \sqrt{900}}{2 \cdot 1} = \frac{-8 - 30}{2} = -16 -$$

$$209x + 1672 - 209x = 8x^2 + 64x$$

не подходит по условию задачи.

$$-8x^2 - 64x + 1672 = 0 \quad | : 8$$

$$x^2 + 8x - 209 = 0$$

$$x_2 = \frac{-8 + \sqrt{900}}{2 \cdot 1} = \frac{-8 + 30}{2} = 11.$$


$$D = b^2 - 4ac$$

Ответ: 11 км/ч.

**Упражнение 21.4.** Два велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Ответ: 14 км/ч.

I  $\xrightarrow{(x+2) \text{ км/ч}}$



	<u>J</u>	<u>t</u>	<u>S</u>
I	$(x+2) \text{ км/ч}$	$\frac{240}{x+2} \text{ ч}$	240 км
II	$x \text{ км/ч}$	$\frac{240}{x} \text{ ч}$	240 км

По условию задачи чувствую, что первый велосипедист прибыл к финишу раньше на 2 часа второго, отсюда уравнение.

$$\frac{240}{x} - \frac{240}{x+2} = 2$$

$$\frac{240}{x} \cancel{(x+2)} - \frac{240}{x+2} \cancel{x} = 2 \cancel{(x^2+2x)}$$

$$\frac{240(x+2) - 240x - 2(x^2+2x)}{x(x+2)} = 0$$

$$240x + 480 - 240x - 2x^2 - 4x = 0$$

$$-2x^2 - 4x + \cancel{240} = 0 \quad / : -2$$

$$x^2 + 2x - \cancel{120} = 0$$

ODS

$$x(x+2) \neq 0$$

$$x \neq 0 \quad x+2 \neq 0$$

$$x \neq -2$$

$$D = b^2 - 4ac = -240$$

$$D = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-\cancel{120}) = 4 + 360 = 364$$

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{364}}{2} = \text{не подходит по ус. задачи т.к. } < 0$$

$$x_2 = \frac{-2 + \sqrt{364}}{2} = \text{скорость второго велосипедиста}$$

Ответ:  $\frac{-2 + \sqrt{364}}{2}$  скорость второго велосипедиста.

**Упражнение 21.5.** Игорь и Паша могут покрасить забор за 14 часов, Паша и Володя – за 15 часов, а Володя и Игорь за 30 часов. За какое время покрасят забор мальчики, работая втроем. Ответ дайте в минутах.

Ответ: 700 минут.

21. *Часы работы /к тк Ареал забора*

И+П  $\frac{1}{14}$  14 1

П+В  $\frac{1}{15}$  15 1

В+И  $\frac{1}{30}$  30 1

$$V(I+P+P+B+B+V) = \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{1}{14} + \frac{1}{10} = \frac{5+7}{70} = \frac{12}{70} = \frac{6}{35} (\text{ч.з./ч})$$

$$t = \frac{A}{V} = \frac{1}{\frac{6}{35}} = \frac{35}{6} \text{ ч.} = \frac{35 \cdot 60}{6} \text{ мин} = 350 \text{ мин}$$

Ответ: 350

**Упражнение 21.6.** Два автомобиля одновременно отправляются в 720-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: 90 км/ч.

	$v, \text{км/ч}$	$t, \text{ч}$	$s, \text{км}$
I автомобиль	$x + 30$	$\frac{720}{x+30}$ <small>Где-то</small>	720
II автомобиль	$x$	$\frac{720}{x}$ <small>на 4 ч раньше</small>	720

Пусть  $x$  — собств. скорость II автомобиля

$$\frac{420}{x} - \frac{720}{x+30} = 4 \quad | \cdot x(x+30) \quad x \neq 0 \\ x \neq -30$$

$$420x + 2160 - 720x = 4x^2 + 120x \\ 2160 - 4x^2 - 120x = 0 \cdot (-1)$$

$$4x^2 + 120x - 2160 = 0 \quad | :4$$

$$x^2 + 30x - 540 = 0$$

$$\Delta = 900 + 4 \cdot 540 = 3060$$

$$x_1 = \frac{-30 + 6\sqrt{85}}{2} = \boxed{-15 + 3\sqrt{85}}$$

$$x_2 = \frac{-30 - 6\sqrt{85}}{2} = -15 - 3\sqrt{85} < 0$$

$$v_{\text{I автомобиль}} \rightarrow -15 + 3\sqrt{85} + 30 = 3\sqrt{85} + 15$$

Ответ:  $3\sqrt{85} + 15$

**Упражнение 21.7.** Два автомобиля одновременно отправляются в 720-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: 90 км/ч.

Обозначим  $v_1$  скорость за  $x$ .

	$v_{\text{км/ч}}$	$t \text{ ч.}$	$S \text{ км.}$
1 авто	$x$	$\frac{x}{720}$	720
2 авто	$x - 30$	$\frac{x-30}{720}$	720

Известно, что 1 авто. приехал на 4 ч. раньше 2 авто.

Запишем уравнение:

$$\frac{720}{x-30} - \frac{720}{x} = 4, \quad | \cdot x(x-30)$$

003:

$$x(x-30) \neq 0$$

$$x \neq 0 \text{ и } x \neq 30.$$

$$\frac{720x - 720(x-30)}{x(x-30)} - 4x(x-30) = 0$$

$$\frac{720x - 720x + 21600 - 4x^2 + 120x}{x(x-30)} = 0$$

$$-4x^2 + 120x + 21600 = 0 \quad | :(-4),$$

$$x^2 - 30x - 5400 = 0,$$

$$\Delta = 900 + 21600 = 22500 = 150^2.$$

$$x_1 = \frac{30 - 150}{2} = -60 \quad - \text{ не удовлетворяет условию задачи.}$$

$$x_2 = \frac{30 + 150}{2} = 80$$

$v_1$  1 авто. =  $x$ , значит  $v_1$  1 авто. = 80 км/ч.

Ответ: 80 км/ч.

**Упражнение 21.8.** Два автомобиля одновременно отправляются в 720-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: 90 км/ч.

Пусть  $x$  — скорость I автомобиля,  
тогда  $(x - 30)$  км/ч — скорость II автомобиля

	$v(\text{км/ч})$	$t(\text{ч})$	$S(\text{км})$
I	$x$	$\frac{720}{x}$	720
II	$x - 30$	$\frac{720}{x - 30}$	720

$$\frac{720}{x-30} - \frac{720}{x} = 4 \quad \text{ODЗ: } x \neq 30 \quad x > 0$$

$$\frac{720x - 720(x-30)}{x(x-30)} = 4$$

$$720x - 720x + 720 \cdot 30 = 4x(x-30)$$

$$4x^2 - 120x - 720 \cdot 30 = 0$$

$$x^2 - 30x - 5400 = 0$$

Ответ: 90 км/ч

По условию:

$$t_{\text{II}} > t_{\text{I}} \text{ на } 4 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$  Составим уравнение:

$$t_{\text{II}} - t_{\text{I}} = 4$$

Составим уравнение:

$$D = 900 + 21600 = 22500$$

$$x_1 = \frac{30 + \sqrt{22500}}{2} =$$

$= 90 \text{ (км/ч)}$  — скорость I автомобиля

$$x_2 = \frac{30 - \sqrt{22500}}{2} =$$

$= -60 \text{ (км/ч)}$  — не удовлетворяет ОДЗ

Ответ: 60 км/ч

## Задание 22

**Упражнение 22.1.** Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ:  $0 < m < 2, m > 6$ .

N22.  $y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2 \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2 \end{cases}$


3)  $y = x^2 + 2$  при  $x \geq -2$   
 $y = x^2 + 2$  — парабола вида  $y = x^2$   
 $x_0 = -\frac{b}{2a} = 0$   
 $y_0 = 0 + 2 = 2$   
 Вершина  $(0; 2)$

$x$	-2	-1	0	1	2	3
$y$	6	3	2	3	6	11

2)  $y = -\frac{6}{x}$  при  $x < -2$

$y = -\frac{6}{x}$  — график гиперболы

$x$	-6	-3	-2
$y$	1	2	3



$y = m$  — прямые параллельные  $Ox$ , имеет 1 общую точку с построенным графиком при  $m \in (0; 2) \cup (6; +\infty)$

Ответ:  $(0; 2) \cup (6; +\infty)$

**Упражнение 22.2.** Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ:  $0 < m < 2, m > 6$ .

22.

$$y = \begin{cases} x^2 + 2, & x \geq -2 \\ -\frac{6}{x}, & x < -2 \end{cases}$$

— кусочно заданная функция с  
 $D(y) = \mathbb{R}$


$y = x^2 + 2$  — квадратичная ф-ция, график — парабола с ветвями, направленными вверх и вершиной  $(0; 2)$

$x$	-2	-1	0	1	2
$y$	6	3	2	3	6

$y = -\frac{6}{x}$  — ф-ция обратной пропорциональности, график — гипербола, расположенная в II и IV четвертях

$x$	-2	-3	-1	-6
$y$	3	2	$1\frac{1}{2}$	1

Построим график:



Прямая  $y = m$  с графиком заданной функции имеет:

- 1 общую точку при  $m \in (0; 2) \cup (6; +\infty)$

- 2 общие точки при  $m \in \{2\} \cup [3; 6]$

- 3 общие точки при  $m \in (2; 3)$

Ответ:  $(0, 2) \cup (6; +\infty)$

**Упражнение 22.3.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

Ответ: 0, -2, 25, 2, 25.

$$y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$$

(1) при  $x \geq 0$

$$y = \frac{1,5 \cdot x - 1}{x - 1,5 \cdot x^2} =$$

$$= \frac{1,5x - 1}{-(1,5x^2 - x)} = -\frac{(1,5x - 1)}{x(1,5x - 1)} =$$

$$= -\frac{1}{x}.$$

$x$	1	4	5
$y$	-1	-0,25	-0,2

$$y(1) = -\frac{1}{1} = -1$$

$$y(4) = -\frac{1}{4} = -0,25$$

$$y(5) = -\frac{1}{5} = -0,2$$

$$y(5) = -\frac{1}{5} = -0,2$$

(2) при  $x < 0$

$$y = \frac{1,5 \cdot (-x) - 1}{-x - 1,5 \cdot (-x)^2} =$$

$$= \frac{-1,5x - 1}{-x - 1,5x^2} =$$


$$= \frac{(-1,5x - 1)}{x(-1 - 1,5x)} = \frac{1}{x}$$

$x$	1	4	5
$y$	1	0,25	0,2

$$y(1) = 1 : 1 = 1$$

$$y(4) = 1 : 4 = 0,25$$

$$y(5) = 1 : 5 = 0,2$$




**Упражнение 22.4.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

Ответ: 0, -2,25, 2,25.

$$y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2} = \frac{1,5|x|-1}{x(1,5|x|-1)} = -\frac{1}{x}$$


$y = -\frac{1}{x}$  - гипербола

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline x & 1 & 2 & 4 \\ \hline y & -1 & -0,5 & -0,25 \\ \hline \end{array}$$




**Упражнение 22.5.** Постройте график функции  $y = \frac{2,5|x| - 1}{|x| - 2,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

Ответ: 0, -6,25, 6,25.



**Упражнение 22.6.** Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

Ответ:  $0, -2,25, 2,25$ .



**Упражнение 22.7.** Постройте график функции  $y = \frac{2,5|x|-1}{|x|-2,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

Ответ:  $0, -6,25, 6,25$ .


$$y = \frac{2,5|x|-1}{|x|-2,5x^2}$$

Раскроем модуль данной функции, получим:

$$y = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{при } x > 0, x \neq 0 \text{ и } x \neq 0,4 \\ \frac{1}{x}, & \text{при } x < 0, x \neq 0 \text{ и } x \neq -0,4 \end{cases}$$

$y = \frac{1}{x}$  — обратная пропорциональность, графиком является гипербола во 2 и 4 четверти, выколотые точки:  $(0,4; -2,5)$

$y = \frac{1}{x}$  — обратная пропорциональность, графиком является гипербола в 1 и 3 четверти, выколотые точки:  $(-0,4; -2,5)$



### Задание 23

**Упражнение 23.1.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 20.

N 23.

Дано:  $ABCD$  - ромб;  $AH$  - высота ( $\angle H = 90^\circ$ );  
 $(AB \parallel DC; AD \parallel BC; AB = BC = AD = BC)$ ;  $DH = 21$ ;  $HC = 8$ ,  
 $AC, DB$  - диагонали.  
Найти:  $AH$ ?

Решение: Рассмотрим  $\triangle DHC$  и  $\triangle AHC$ .

см. лист. 4

$\angle DHC = \angle AHC$  (как  $\angle$  с взаимоперпендиц. сторонами);

$\triangle DHC$  и  $\triangle AHC$  - прямоугол. ( $\angle D = \angle H = 90^\circ$ )  $\Rightarrow$

$\triangle DHC \sim \triangle AHC$  (по 2-м углам).

$$\frac{BO}{AH} = \left( \frac{DC}{HC} = \frac{DC}{AC} \right)$$

Диагонали ромба делятся точкой пересечения пополам.  $\Rightarrow$

$$DC = \frac{1}{2} AC$$

$$\frac{\frac{1}{2} AC}{HC} = \frac{DC}{AC}; AC = \sqrt{2CH \cdot CD} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 21} = \sqrt{16 \cdot 21} = 4\sqrt{21}$$

по теореме Пифагора:

$$AH^2 = AC^2 + CH^2$$

$$AH^2 = (4\sqrt{21})^2 + 8^2$$

$$AH^2 = 16 \cdot 21 + 64$$

$$AH^2 = 464 + 64$$

$$AH^2 = 528$$

$$AH = \sqrt{528} = \sqrt{464 \cdot 16 \cdot 21} = 8 \cdot 4 \cdot \sqrt{21} = 32\sqrt{21}$$

Ответ:  $32\sqrt{21}$


**Упражнение 23.2.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 24$  и  $CH = 2$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 10.

<p>Дано:  <math>ABCD</math> - ромб  <math>AH</math> - высота  <math>DH = 24</math>  <math>CH = 2</math></p> <p>Найти: <math>AH = ?</math></p>	<p>Решение:</p> <p><math>CD = CA = BD = AB</math>,      т.к. <math>ABCD</math> - ромб</p> <p><math>CH + HD = 26</math></p> <p><math>CD = AB = AC = BD = 26</math>, <del>т.к.</del></p> <p><del>След. по теореме Пифагора</del></p> <p><math>AH^2 = 26^2 - 2^2 = 676 - 4 = 672</math></p> <p><math>AH = \sqrt{672} = 4\sqrt{42}</math></p> <p>Ответ. <math>4\sqrt{42}</math>.</p>
---	--

**Упражнение 23.3.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 24$  и  $CH = 2$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 10.

	<p>т.к. у ромба все стороны равны, то  <math>AB = BC = CD = DA = 26</math>. Тогда <math>AH^2 = AD^2 - DH^2 = 676 - 576 = 100 = 10^2</math>.</p> <p>Ответ: <math>AH = 10</math>.</p>
---	---

**Упражнение 23.4.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 20.

Задание 23.

Дано:

$ABCD$  - ромб       $DH = 21$        $CH = 8$

$AH$  - высота, делит  $CD$

Найти.

$AH$  - ?

Решение

$AB = BC = CD = AD$        $AD = DH + CH = 21 + 8 = 29$  (по свойству ромба)

рассмотрим  $\triangle ADH$ , он прямоугольный т.к.  $AH$  - высота.

Вспомогательные формулы теоремы Пифагора

$$AD^2 = DH^2 + AH^2$$

$$AH^2 = AD^2 - DH^2$$

$$AH^2 = 29^2 - 21^2 = \sqrt{841 - 441} = \sqrt{400} = 20$$

Отвем.  $AH = 20$

**Упражнение 23.5.** Окружность пересекает стороны  $AB$  и  $AC$  треугольника  $ABC$  в точках  $K$  и  $P$  соответственно и проходит через вершины  $B$  и  $C$ . Найдите длину отрезка  $KP$ , если  $AP = 21$ , а сторона  $BC$  в 3 раза меньше стороны  $AB$ .


Ответ: 3.

~23 Дано:

$\triangle ABC$

окружность  
окр-ть пересекает  $AB$  в  $K$   
окр-ть пересекает  $AC$  в  $P$   
окр-ть проходит через  $B$  и  $C$   
 $AP = 9$   
 $BC$  в 3 раза <  $AB$

Найти:  
 $KP = ?$



↓ смотреть число 3

1) Рассмотрим четырехугольник  $KBCP$ , он вписанный  
 $\Rightarrow$  сумма противоположных углов  $= 180^\circ \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$   
 $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1$ . 2) Рассмотрим  $\angle 1$  и  $\angle 2$  - смежные  $\Rightarrow$   
 сумма углов  $= 180^\circ \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ \angle 2 = 180^\circ - \angle 1$   
 $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1 \Rightarrow \angle 3 = \angle 2$  3) Рассмотрим  $\triangle APK$  и  $\triangle ABC$   
 1)  $\angle A$  - общий 2)  $\angle 3 = \angle 2 \Rightarrow \triangle APK \sim \triangle ABC$  по двум равенствам углов. 4) Из подобия следует отношение сходственных сторон  $\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB}$  т.к.  $BC$  в 3 раза меньше  $AB$   
 будем  $BC = 3 AB = 1 \frac{x}{3} = \frac{9}{1} \leftarrow x = \frac{9 \cdot 3}{1} = 27$

Ответ:  $KP = 27$

**Упражнение 23.6.** Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 20.

Given  $DH = 21$ ,  $CH = 8$   
Find  $AH$

$$DC = 21 + 8 = 29$$
$$DC = CB = BA = AD = 29$$
~~$$AH^2 = 29^2 = 21^2 + x^2$$~~
$$841 = 441 + x^2$$
$$x^2 = 341 - 441$$
$$x^2 = 400$$
$$x = 20$$

Answer:  $AH = 20$

**Упражнение 23.7.** Точка  $H$  является основанием высоты  $BH$ , проведённой из вершины прямого угла  $B$  прямоугольного треугольника  $ABC$ . Окружность с диаметром  $BH$  пересекает стороны  $AB$  и  $CB$  в точках  $P$  и  $K$  соответственно. Найдите  $PK$ , если  $BH = 13$ .

Ответ: 13.

~23

Дано:  $ABC$ -прямоугольный  $\triangle$ ;  $BH$ -высота;  $PK=13$   
 $A \hat{B} \hat{P}$ ;  $C \hat{B} \hat{K}$

Найти:  $BH$


Решение:

точка  $O$  лежит на  $BH$  и  $PK$   
 $BK$  является диаметром окружности  $\Rightarrow PK$  диаметр  
Значит  $PK = BK = 13$

Ответ: 13

Задание 24

**Упражнение 24.1.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , приём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону относительно прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.




Дано:  $C$  и  $D$ -точки пересечения окружностей;  
 $E$  и  $F$  по одну сторону от  $CD$ .  
Доказать:  $CD \perp EF$

Доказ-бо:

- 1) Проведём радиусы  $CE; ED; CF; FD$ .
- 2) Рассмотрим твр-к  $CDE$ . Радиусы равны  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow$  твр-к равнобедренный.
- 3) Проведём медиану  $EM$ . В равнобедренном  
твр-нике медиана, проведённая к основанию  
явл. высотой  $\Rightarrow EM$ -высота.
- 4) Рассмотрим твр-к  $CFD$ . Радиусы равны  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow$  твр-к равнобедренный  $\Rightarrow$  медиана,  
предведенная к основанию явл. высотой.  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow FM$ -медиана и высота.
- 5) Высоты  $EM$  и  $FM$  лежат на одной прямой  
с отрезком  $FE$ ; основание  $CD$  лежит на прямой  $EF$ .
- 6) Так как  $EM$  и  $FM$   $\perp$  к основанию  $CD$  и лежат  
на одной прямой с  $EF$ , то  $EF \perp CD$ .  
 $\square$ . Т.г.

**Упражнение 24.2.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , приём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону относительно прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.



Дано: окружность с центром  
в точке  $E$ , окружность с цент-  
ром в точке  $F$  точка  $C$ , точка  
пересечения окруж-  
ностей

Доказать:  $EF \perp CD$

1) ~~Рассмотрим треугольник  $CFD$ .~~

2) Так как пересечение  $EF$  и  $CD$  -  $\text{K}$ , а пересечение с окружностью

3) Так как центры окружностей находятся на одной прямой,  
 $CD$  их общая хорда, а  $EF$   $\text{PL}$  - радиус одной из окружнос-  
тей, то  $FK$  делит  $CD$  пополам.

4) Рассмотрим треугольник  $CFD$ ,  $FK$  - медиана  $CD$ ,

5)  $FD = FC$ , т.к. они являются радиусами окружности

6) следовательно  $\triangle CFD$  - равнобедренный, следовательно  $FK$   
также является высотой, следовательно  $EF \perp CD$

**Упражнение 24.3.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , приём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону относительно прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

Задание № 24  
Дано:

$E$  и  $F$  —  
центры окружностей,  
демонстрирующие  
одинаковую величину.

Доказать, что  $CD \perp EF$ ?

Доказательство:  
 $CD$  является биссектрисой падающей к  
окружности, а между образцами углов  $= 90^\circ$ ,  
таким образом  $CD \perp EF$ .

**Упражнение 24.4.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , приём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону относительно прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

Доказ. окр. сч.  $E$ , окр. сч.  $F$   
окр. пересекаются в сч.  $C$  и  $D$ ;

Доказ.:  $CD \perp EF$

Доказ.:

1). Проведем радиусы  $EC, ED, FD, FC$


$EC = ED$  (радиусы)  $\Rightarrow$   $E$  равноудалена от  $C$  и  $D$  ?

$FC = FD$  (радиусы)  $\Rightarrow$   $F$  равноудалена от  $C$  и  $D$  ?

$\Rightarrow EF$  — сч. перпендикуляр к  $CD$   $\Rightarrow EF \perp CD$

**Упражнение 24.5.** Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , приём точки  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону относительно прямой  $CD$ . Докажите, что прямые  $CD$  и  $EF$  перпендикулярны.

Задание № 24



$C$  и  $D$  — точки пересечения окружностей


Доказать:  $EF \perp CD$

Доказательство:

Т.к.  $E$  и  $F$  — центры окружностей, то  $EF$  является осью симметрии для обеих окружностей. Предположим, что  $EF$  не перпендикулярна  $CD$ , тогда две точки  $C$  и  $D$  должны быть симметричны, но это противоречит условию задачи, т.к.  $C$  и  $D$  — точки пересечения двух окружностей

**Упражнение 24.6.** Биссектрисы углов  $A$  и  $D$  параллелограмма  $ABCD$  пересекаются в точке  $K$ , лежащей на стороне  $BC$ . Докажите, что  $K$  — середина  $BC$ .

№ 24



Доказательство:

$AB = CD$  (тк  $ABCD$  — ромб).

Рассмотрим  $\triangle ABK$

он равнобедренный (тк биссектриса паралл. отсекает р.б. треугольника)  $\Rightarrow$

$\rightarrow AB = BK$ .

Рассмотрим  $\triangle KCD$ : он равнобедренный (тк биссектриса параллелограмма отсекает р.б. треугольника)  $\Rightarrow KC = CD$ .

Т.к.  $AB = CD$ ,  $AB = BK$ ,  $CD = KC \Rightarrow BK = KC \Rightarrow K$  — середина  $BC$ .

См. пункт 2.

Дано:

$ABCD$  — параллелепи-  
дровид.

$K$  — точка пересе-  
чения биссектрис.

Доказать:


$K$  — середина  $BC$ .

Выvod: ЧТД.

### Задание 25

**Упражнение 25.1.** В треугольнике  $ABC$  биссектриса угла  $A$  делит высоту, проведённую из вершины  $B$ , в отношении  $5:4$ , считая от точки  $B$ . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , если  $BC = 6$ .

Ответ: 5.



Дано:

Окр( $O; R$ )

$\triangle ABC$

$BC = 6$

$AA_1$  - биссектриса

$BH$  - высота.

$BH:MH = 5:4$ .

Найти:

$R$

Решение:

$$R = \frac{BC}{2\sin A} = \frac{6}{2\sin A} = \frac{3}{\sin A}.$$

1. Рассмотрим  $\triangle ABH$ :

$$\sin A = \frac{BH}{AB} = \frac{9x}{AB} = \frac{9x}{5x} = 1,8 \quad (\text{т.к. } AM \text{ делит основание,}$$

$$\Rightarrow R = \frac{3}{\sin A} = \frac{3}{1,8} = \frac{5}{3} \quad | \frac{2}{3}$$

в таком же отношении, что и базовое синус)

$$\text{Ответ: } R = \frac{5}{3}.$$

**Упражнение 25.2.** В трапеции  $ABCD$  боковая сторона  $AB$  перпендикулярна основанию  $BC$ . Окружность проходит через точки  $C$  и  $D$  и касается прямой  $AB$  в точке  $E$ . Найдите расстояние от точки  $E$  до прямой  $CD$ , если  $AD=6$ ,  $BC=5$ .

Ответ:  $\sqrt{30}$ .

**Data:**

- $BC = 5$
- $AD = 6$
- $BC \parallel AD$
- $AB \perp BC$  - прямая
- $BA \perp BC$

**Число 1)**  
окружность с центром  $A$  касается прямой  $AB$  в точке  $M$ ,  
и.к. кружок идет из центра  $A$  в точке  $E$  до прямой  $(D) \Rightarrow \angle END = 90^\circ$

**Число 2)**  
и.к.  $ME$  - касательная, а  $MD$  - секущая, то по  
теореме о касательной и секущей  $\Rightarrow ME^2 = MC \cdot MD$

**Число 3)**  $\triangle MBC \sim \triangle EMN$  и  $\triangle AMD$  - прямоделенные (закр.  $\angle$ )  
 $\triangle MBC \sim \triangle EMN$  по углам ( $\angle BMC = \angle EMN$ )  
 $\triangle EMN \sim \triangle MAD$  по углам  $\angle EMN = \angle MAD$

**Число 4)**  
из подобия  $\triangle MBC \sim \triangle EMN \Rightarrow \frac{EN}{BC} = \frac{EM}{MC} \Rightarrow$   
из подобия  $\triangle EMN \sim \triangle MAD \Rightarrow \frac{EN}{AD} = \frac{EM}{MD} \Rightarrow$


$EN^2 = BC \cdot AD \cdot \frac{EM^2}{MC \cdot MD}$       из п. 2  $\Rightarrow \frac{EN^2}{MC \cdot MD} = 1 \Rightarrow$

$EN^2 = BC \cdot AD \quad EN^2 = 5 \cdot 6 \quad EN > 0 \Rightarrow EN = \sqrt{30}$

Ответ:  $EN = \sqrt{30}$

**Упражнение 25.3.** В трапеции  $ABCD$  боковая сторона  $AB$  перпендикулярна основанию  $BC$ . Окружность проходит через точки  $C$  и  $D$  и касается прямой  $AB$  в точке  $E$ . Найдите расстояние от точки  $E$  до прямой  $CD$ , если  $AD = 6$ ,  $BC = 5$ .

Ответ:  $\sqrt{30}$ .



N 25.

Дано:  $ABCD$  -трап.  
 $AB \perp BC$   
 т. т.  $C, D, E$  -  
 на окр., т.  $E \in AB$   
 $AD = 6$   
 $BC = 5$

Найти:  $EH = ?$

См. лист 4

1. продолжим  $DC$  и  $AB$ , т. пересеч. продолж. сторон обозначим т.  $K$
2. из т.  $C$  проводим высоту к стороне  $AD$ , обозначим её  $CM$ .
3. т.к.  $ABCD$ -трап.  $\Rightarrow BC \parallel AD$ , но усн.  $AB \perp BC$ , выс.  $CM \perp BC$ ,  
 $\Rightarrow CM \perp \parallel AB$ ,  $\angle ABC = 90^\circ$ ,  $\angle BAN = 90^\circ$  (но сб-бы трап.),  $CM \perp AD$   
 $\angle CMA = 90^\circ$ ,  $\angle BCN = 90^\circ$  ( $CM$ -всн.,  $CM \perp BC$ ,  $CM \perp AD$ )
4.  $CM \parallel AB$  (н. 3)  $\Rightarrow ABCM$ -прямоуг.  
 $BC \parallel AN$  (н. 3)  
 $\angle BCA = 6$  четир.  $\angle ABCM = 90^\circ$   $\Rightarrow BC = AM = 5$

$$5. AD = AM + MD \Rightarrow MA = AD - AM = AD - BC = 6 - 5 = 1$$

6. рассмотрим  $\triangle KBC$  и  $\triangle CMA$ :

$$\angle KBC = \angle CMA = 90^\circ$$

• при  $BC \parallel AD$  ( $ABCD$ -трап.)  $KD$ -секущ.,  
 и накрест-лежащие  $\angle = \Rightarrow \angle KCB = \angle CAD$

$\Rightarrow \triangle KBC \sim \triangle CAD$   
 (но 2 угл.)

7. по т. о квадрате касательной:

$$EK^2 = KD \cdot KC, KD = (KC + CD) \Rightarrow \frac{5}{1} = \frac{KC}{CD} \Rightarrow KC = 5CD$$

$$EK^2 = KC \cdot (KC + CD) \cdot KC$$

$$\text{т.к. } KC = 5CD \Rightarrow EK^2 = 6CD \cdot CD \Rightarrow EK = \sqrt{6CD^2} = CD \cdot \sqrt{6}$$

8. В четыр.  $AEGH$   $\angle EAD = \angle EHD = 90^\circ$ , но т.о сумма с в четыр.:

$$\underbrace{\angle EAD + \angle EHD}_{\text{сумма прямых}} + \angle HDA + \angle AEH = 360^\circ \Rightarrow \angle HDA + \angle AEH = 180^\circ$$

9.  $\angle KEH$  и  $\angle CAEH$   $180^\circ$  смежные  $\Rightarrow$  но сб-бд  $\angle KEH + \angle AEH = 180^\circ$

$$10. \begin{aligned} \angle KEH + \angle AEH &= 180^\circ \quad (\text{n. 9}) \\ \angle HDA + \angle AEH &= 180^\circ \quad (\text{n. 8}) \end{aligned} \Rightarrow \angle KEH = \angle HDA$$

11. рассм.  $\triangle KHE$  и  $\triangle CDA$ :


$$\begin{aligned} \angle KHE &= \angle CDA = 90^\circ \\ \angle KEH &= \angle HDA \quad (\text{n. 10}) \end{aligned} \Rightarrow \triangle KHE \sim \triangle CDA \quad (\text{по 2мл})$$

$$EH = \frac{1 \cdot EL}{CD} = \frac{CD \cdot EB}{CD} \quad (\text{n. 7}) = EB$$

Ответ:  $\sqrt{6}$

**Упражнение 25.4.** В трапеции  $ABCD$  боковая сторона  $AB$  перпендикулярна основанию  $BC$ . Окружность проходит через точки  $C$  и  $D$  и касается прямой  $AB$  в точке  $E$ . Найдите расстояние от точки  $E$  до прямой  $CD$ , если  $AD = 6$ ,  $BC = 5$ .

Ответ:  $\sqrt{30}$ .



Дано:  $ABCD$  - трапеция  
 $AB \perp BC$   
 $AD = 6$   
 $BC = 5$   
Окружность  
Найти:  $EK$

Решение:

1) Построим прямые  $AB$  и  $CD$  так, чтобы они пересеклись в м.  $F$ .  
Расс-нин  $\triangle BFC$  и  $\triangle AFD$ :

$\angle F \text{ - общ.} \Rightarrow \triangle BFC \sim \triangle AFD$  по 2м умн

$\angle A = \angle FBC$

$$\frac{BC}{AD} = \frac{FC}{FD} = \frac{FB}{FA} = \frac{5}{6}$$

2) Проведем вспомог.  $CM$

$$AD = AN + MD$$

$B \in AM$  (тк  $\angle A = \angle ABC = \angle BCM = \angle CMA = 90^\circ \Rightarrow ABCD$  - прямой трапеци)

$$AN = 5$$

$$MD = AD - AN$$

$$MD = 6 - 5 = 1$$

Расс-нин  $\triangle AFD$  и  $\triangle MCD$ :

$\angle D \text{ - общ.} \Rightarrow \triangle AFD \sim \triangle MCD$  по 2м умн

$CM$ . ищетс

3) Тк  $\triangle BFC \sim \triangle AFD$  и  $\triangle MCD \sim \triangle AFD \Rightarrow \triangle MCD \sim \triangle BFC \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \frac{MD}{BC} = \frac{CD}{FC} = \frac{CM}{FB} = \frac{1}{5}$   
 $\frac{CD}{FC} = \frac{1}{5} \Rightarrow FC = 5CD$   
 Искомо  $\frac{FC}{CD} = x \Rightarrow CD = 5x$

4)  $FE^2 = FC \cdot CD$  (по теор. о кат. и синус.)  
 $FE^2 = \cancel{FC} \cdot (FC + CD)$   
 $FE^2 = x(x + 5x)$   
 $FE^2 = 6x^2$   
 $FE = \sqrt{6} \cdot x$

5) Расс-ннм  $\triangle EFK$  и  $\triangle AFD$ :  
 $\angle F = \text{одно} \Rightarrow \triangle EFK \sim \triangle AFD$  по 2м угла  $\Rightarrow$   
 $\angle FKE = \angle A$   
 $\Rightarrow \angle FEL = \angle FDA$

6) Расс-ннм  $\triangle MCD$ :  
 $\cos \angle D = \frac{MD}{CD}$

7) Тк  $\angle D = \angle E \Rightarrow \cos \angle D = \cos \angle E$   
 8) Расс-ннм  $\triangle EFK$   
 $\cos \angle E = \frac{EK}{EF}$

$\cos \angle E = \cos \angle D \Rightarrow$   
 $\Rightarrow \cos \angle D = \frac{EK}{EF}$

$\frac{1}{5x} = \frac{EK}{\sqrt{6} \cdot x}$   
 $EK \cdot 5x = \sqrt{6} \cdot x$

$EK = \frac{\sqrt{6} \cdot x}{5x}$


$EK = \frac{\sqrt{6}}{5}$

Отвем:  $\frac{\sqrt{6}}{5}$

**Упражнение 25.5.** В трапеции  $ABCD$  боковая сторона  $AB$  перпендикулярна основанию  $BC$ . Окружность проходит через точки  $C$  и  $D$  и касается прямой  $AB$  в точке  $E$ . Найдите расстояние от точки  $E$  до прямой  $CD$ , если  $AD=6$ ,  $BC=5$ .

Ответ:  $\sqrt{30}$ .

25



Дано:

$ABCD$ -трап.;  $AB \perp BC$ ;  
 окружность;  
 $[w(O, R)]$ ;  $C \in w$ ;  $D \in w$

$E \in w$ ;  $E \in AB$ ;

$EL \perp CD$ ;  $AD=6$ ;  $BC=5$

Найти:  $EL$

Решение:

1) Проведём хорды  $EC$  и  $ED$

2) Т.к.  $AB \perp BC \Rightarrow \angle ABC = 90^\circ$ ;

3) Т.к.  $ABCD$ -трап. (по ум.)  $\Rightarrow BC \parallel AD$  (по ~~об. бы~~)  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow \angle BAD = \angle CBA = 90^\circ$  (как односторонние при  $BC \parallel AD$   
и ср.  $AB$ )

4) Пок-и  $\triangle EBC$  и  $\triangle ELD$


$$\angle ELD = \angle EBC = 90^\circ$$

$\angle BEC = \angle ECD$  (по теореме об угле между касательной и хордой)  
см. пункт 5

$\Rightarrow \triangle EBC \sim \triangle ELD$  (по 2 угла)

5)  $\triangle EBC \sim \triangle ELD$  (по н.у.)  $\Rightarrow$

$$\frac{EB}{DL} = \frac{EC}{DE} = \frac{BC}{LE}$$



6) Пок-и  $\triangle AED$  и  $\triangle CEL$


$$\angle CLE = \angle EAD = 90^\circ$$

$\angle CEL = \angle AED$  (по теореме об угле между касательной  
и хордой)

$\Rightarrow \triangle AED \sim \triangle CEL$  (по 2 угла)

7)  $\triangle AED \sim \triangle CEL$  (по н.у.)  $\Rightarrow$

$$\frac{EL}{AE} = \frac{LE}{AD} = \frac{EC}{ED}$$



8)  $\frac{EC}{ED} = \frac{LE}{AD}$  (по н.у.) ;  $\frac{EC}{ED} = \frac{BC}{LE}$  (по н.5)  $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{BC}{LE} = \frac{LE}{AD} \Rightarrow BC \cdot AD = LE^2$$

$$LE^2 = 5 \cdot 6 = 30 \Rightarrow LE = \sqrt{30}$$

Отв. см.:  $\sqrt{30}$

## Комментарии и оценивание

- 20.1.** Все этапы решения присутствуют. Три корня найдены верно. Отсутствие третьего корня в ответе следует считать оплошностью, не влияющей на правильность решения. Оценка 2 балла.
- 20.2.** Во второй и третьей строках записи лишены смысла и не связаны друг с другом и с условием. Оценка 0 баллов.
- 20.3.** Не учтено ограничение  $6 - x \geq 0$ . Оценка 0 баллов.
- 20.4.** Некорректная запись при нахождении дискриминанта. Этот недостаток не связан с математической ошибкой. При нахождении корня имеется ошибка, которую можно счесть арифметической – потерян знак. Оценка 1 балл.
- 20.5.** Нет ни проверки, ни ограничения на знаменатель. Вычислительная ошибка на последнем шаге. Оценка 0 баллов.
- 20.6.** Правильно выполнены преобразования, получен верный ответ. Имеется не использующаяся в современных учебниках запись  $\sqrt{D} = \pm 7$ , однако она никак не влияет на верность и последовательность рассуждений. Оценка 2 балла.
- 20.7.** Преобразования выполнены верно. Арифметическая ошибка при нахождении корня. Не использующаяся в современных учебниках запись  $\sqrt{D} = \pm 7$  не влияет на оценку. Оценка 1 балл.
- 20.8.** Имеются признаки несамостоятельного выполнения: строки решения, начиная с четвертой, не связаны между собой. Несколько раз «потеряны» знаки, несоответствия в записях и вычислительная ошибка в конце. Оценка 0 баллов.
- 20.9.** Решение несколько запутанное, но, в целом, верное. Имеется арифметическая ошибка: вместо свободного члена  $-6$ , получился свободный член  $-2$ . В результате не найдены два корня из трех. Оценка 1 балл.
- 20.10.** При вынесении за скобки в 4-й строке имеется алгебраическая ошибка, которая не нарушает логики решения. Впоследствии имеется алгебраическая ошибка в решении уравнения  $(x+1)^2 = 0$ . Оценка 0 баллов.
- 20.11.** При вынесении общего множителя допущена ошибка или описка в знаке. В результате решена другая задача. Оценка 0 баллов.
- 21.1.** Ход решения понятный, ответ верный. Оценка 2 балла.
- 21.2.** Логическая ошибка — участник экзамена перепутал производительность труда и время. Оценка 0 баллов.
- 21.3.** Ход решения понятный, ответ верный. Однако допущена арифметическая ошибка при вычислении побочного корня. Оценка 1 балл.
- 21.4.** Вместо «224 км» написал «240 км». Относительно значения «240 км» задача решена верно. Но решена другая задача. Оценка 0 баллов.
- 21.5.** Ход решения понятен, но на последнем этапе допущена логическая ошибка. Оценка 0 баллов.
- 21.6.** Уравнение составлено верно. Имеется арифметическая ошибка. Оценка 1 балл.
- 21.7.** Уравнение составлено и приведено к квадратному верно. Арифметическая ошибка в вычислении корня. Оценка 1 балл.
- 21.8.** Уравнение составлено и приведено к квадратному верно. Ошибка в написании ответа: указано не то значение. Оценка 1 балл.

- 22.1.** График построен верно, верно найдены значения  $m$ . Оценка 2 балла.
- 22.2.** График построен верно, верно найдены значение  $m$ . Оценка 2 балла.
- 22.3.** График построен неверно, коэффициенты не найдены. Оценка 0 баллов.
- 22.4.** График неверный. Выколотые точки не найдены и не обозначены, коэффициенты не найдены. Оценка 0 баллов.
- 22.5.** График построен верно, верно найдены 2 из 3 значений  $k$ . Оценка 1 балл.
- 22.6.** Решение понятное. Участник не пишет, что построенные кривые являются фрагментами гипербол, но это и не требуется. Значения параметра найдены верно, но способ их нахождения неясен. Оценка 1 балл.
- 22.7.** График построен верно, верно найдены 2 из 3 значений  $k$ . Оценка 1 балл.
- 23.1.** Доказано подобие треугольников  $DOC$  и  $AHC$ , верно составлена пропорция, из неё верно найдена диагональ  $AC$ . Но в записи теоремы Пифагора для треугольника  $AHC$  допущена геометрическая ошибка. Оценка 0 баллов.
- 23.2.** Экзаменуемый решает другую задачу: изменен порядок расположения отрезков. Оценка 0 баллов.
- 23.3.** Задача решена верно, несмотря на неудачное изображение перпендикуляра  $AH$ . Оценка 2 балла.
- 23.4.** Ход решения понятен, все шаги выполнены правильно. Наличие квадрата в записи  $AH^2 = \sqrt{29^2 - 21^2}$  следует считать оплошностью, не влияющей на правильность решения и оценку. Оценка 2 балла.
- 23.5.** Ход решения верный, все шаги выполнены правильно, но в конце допущена существенная ошибка: предположение  $BC = 3, AB = 1$ . Оценка 0 баллов.
- 23.6.** Ход решения верный, все шаги выполнены правильно. Оценка 2 балла.
- 23.7.** Не доказано, что отрезок  $PK$  является диаметром окружности. Оценка 0 балл
- 24.1.** Ход рассуждений понятен. В целом, доказательство верное. Оценка 2 балла.
- 24.2.** Рассуждения непонятны. Утверждения необоснованные. Рисунок не соответствует записям. Оценка 0 баллов.
- 24.3.** Чертёж не соответствует условию, текст не связан. Оценка 0 баллов.
- 24.4.** Доказательство верное, все шаги обоснованы. Оценка 2 балла.
- 24.5.** Доказательство верное и полное. Оценка 2 балла.
- 24.6.** Доказательство в целом верное, но содержит неточность: нет пояснения факта, почему биссектриса в параллелограмме отсекает равнобедренный треугольник. Оценка 1 балл.
- 25.1.** Логическая ошибка, неверно применено свойство биссектрисы. Оценка 0 баллов.
- 25.2.** Решение верное. Оценка 2 балла.
- 25.3.** Ход решения верный, все шаги присутствуют, допущена ошибка: при применении свойства касательной вместо  $5CD$  подставлено  $CD$ . Отсюда неверный ответ. Оценка 1 балл.
- 25.4.** Ход решения верный, все шаги присутствуют, но допущена одна ошибка (см. п. 3). Оценка 1 балл.
- 25.5.** Ход решения верный, все шаги присутствуют, имеющееся неверное обозначение угла в п. 4 следует считать несущественной оплошностью. Оценка 2 балла.

## **ЧАСТЬ 4 Материалы по оценке решений заданий с развернутым ответом для зачета или квалификационной работы**

Опираясь на приведенные критерии оценивания, оцените решения заданий 20 – 25 в предложенных вариантах.

### **Критерии оценивания выполнения задания 20**

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущена арифметическая ошибка, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

### **Критерии оценивания выполнения задания 21**

Содержание критерия	Баллы
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Ход решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена арифметическая ошибка	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

### **Критерии оценивания выполнения задания 22**

Содержание критерия	Баллы
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

### **Критерии оценивания выполнения задания 23**

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные объяснения или допущена одна вычислительная ошибка	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

**Критерии оценивания выполнения задания 24**

Содержание критерия	Баллы
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит неточности	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	<b>2</b>

**Критерии оценивания выполнения задания 25**

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Ход решения верный, все его шаги присутствуют, но допущена ошибка вычислительного характера	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	<b>2</b>

### Вариант 1

Таблица оценивания

Задание	20	21	22	23	24	25
Оценка						

**20.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$ .

Ответ:  $-0,2, 0,5$ .

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0 \quad | \cdot x^2 \quad x \neq 0$$

$$1 + 3x - 10x^2 = 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$10x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-1) = 9 + 40 = 49$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 10} = \frac{3 \pm 7}{20}$$

$$x_1 = \frac{1}{2} = 0,5 \quad x_2 = -\frac{4}{20} = -\frac{1}{5} = -0,2$$

Ответ:  $x_1 = 0,5, x_2 = -0,2$

21. Два автомобиля одновременно отправляются в 540-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: 90 км/ч.

	$v_x$	$t_x$	$s_x$
I авт	$v + 30$	$t - 3$	540
II авт	$v$	$t$	540

Пусть  $v$ - скорость II автомобиля,  $t$ - время за которое II автомобиль проходит весь путь,  $s$ - расстояние составляющее систему уравнений.

$$\begin{cases} (v+30)(t-3) = 540 \\ v \cdot t = 540 \end{cases} \quad t = \frac{540}{v}$$

$$(v+30)\left(\frac{540}{v} - 3\right) = 540$$

$$540 + \frac{30 \cdot 540}{v} - 90 - 3v = 540 \quad | \cdot \frac{v}{3}$$

$$v^2 + 30v - 5400 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 30^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5400) = 900 + 21600 = 22500$$


$$v_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-30 \pm 150}{2}$$

$v_1 = 60$        $v_2 = -90$  - не подходит, тк скорость не может быть отрицательной

Скорость I автомобиля на 30 км/ч больше скорости второго  $\Rightarrow$  скорость I автомобиля равна 90 км/ч  
Отвт. 90 км/ч

22. Постройте график функции  $y = \frac{1,5|x|-1}{|x|-1,5x^2}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  не имеет с графиком ни одной точки пересечения.

Ответ:  $-2,25, 0, 2,25$ .



23. Углы  $B$  и  $C$  треугольника  $ABC$  равны соответственно  $65^\circ$  и  $85^\circ$ . Найдите  $BC$ , если радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , равен 14.

Ответ: 14.

$\sim 23$

Дано  $\triangle ABC$ ,  $\angle B = 65^\circ$ ,  $\angle C = 85^\circ$ ,  $R = 14$ .  
найти  $BC$

Решение:

Пк сумма углов треугольника равна  $180^\circ \Rightarrow \angle A = 180 - \angle B - \angle C = 180^\circ - 65^\circ - 85^\circ = 30^\circ$

По теореме синусов

$$\frac{BC}{\sin \angle A} = 2R \Rightarrow BC = \sin \angle A \cdot 2R = \sin 30^\circ \cdot 2R = \frac{1}{2} \cdot 2R = R = 14$$

Ответ  $BC = 14$

24. Сторона  $AB$  параллелограмма  $ABCD$  вдвое больше стороны  $BC$ . Точка  $L$  — середина стороны  $AB$ . Докажите, что  $CL$  — биссектриса угла  $BCD$ .


$\sim 24$

Дано:  $ABCD$  — параллелограмм  
 $AB = 2BC$ ,  $L$  — середина  $AB$   
Док-ть:  $CL$  — бис-са  $\angle BCD$

Док-во: Пк  $L$  — середина  $AB \Rightarrow BL = \frac{1}{2}AB = BC$   
 $\triangle BLC$  — равнобедренный  $\Rightarrow \angle BLC = \angle BCL$  (углы при основании). Пк  $LB \parallel DC \Rightarrow \angle BLC = \angle BCL$  как  
наименование при пересечении  $LC$   $\Rightarrow CL$  — бис-са  
 $\angle BCD$ . ЧТЗ.

25. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 200, а площадь равна 2000, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

Ответ: 8.



~ 25

Дано: ABCD - равнобедренная трапеция.

$$P_{ABCD} = 200 \quad S_{ABCD} = 2000$$

Найти: OH

решение.

$$P_{ABCD} = 200 = AB + CD + BC + AD = 2AB + BC + AD \text{ (тк } AB = CD)$$

т.к. в трапецию вписана окружность  $\Rightarrow$

$$2AB = BC + AD \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4AB = 200 \quad AB = 50$$

$$S_{ABCD} = 2000 = \frac{1}{2} (BC + AD) \cdot h_{AB} = 50 \cdot h_{AB} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h_{AB} = 40 = BH_2 = CH_3$$

т.к. ABCD - равнобедренная  $\Rightarrow H_2H_3 = BC, AH_2 = DH_3$

По теореме Пифагора находим  $AH_2$

$$AH_2^2 = AB^2 - BH_2^2 \quad AH_2 = \sqrt{50^2 - 40^2} = 30$$

$$\text{т.к. } AH_2 = DH_3 \Rightarrow 2BC = 40 \quad BC = 20 \Rightarrow AD = 80$$

$\triangle AOH_1 \sim \triangle COH_3$  по двум углам ( $\angle AOH_1 = \angle COH_3$  как вертикальные,  $\angle BCD = \angle DAB$  как накрест лежащие при параллельных прямых BC и AD и секущей AC)  $\angle C = \frac{1}{2} BC = 10 \quad AH_1 = \frac{1}{2} AD = 40$

$$\frac{HC}{AH_1} = \frac{HO}{OH_1} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} \Rightarrow OH = \frac{1}{5} AH_1 = 8$$

Ответ: OH = 8

**Вариант 2**

Таблица оценивания

Задание	20	21	22	23	24	25
Оценка						

**20.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - 12 = 0$ .

Ответ:  $-\frac{1}{6}, \frac{1}{2}$ .

20	$\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - 12 = 0$
$1 + 4x - 12x^2 = 0$ ОДЗ: $x \neq 0$ $12x^2 - 4x - 1 = 0$ $12x^2 - 6x + 2x - 1 = 0$ $(2x - 1)(6x + 1) = 0$ $x = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \vee \quad x = -\frac{1}{6}$	
Реш.: $0,5 ; -\frac{1}{6}$	

Рп.:



21. Два автомобиля одновременно отправляются в 540-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 30 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

Ответ: 90 км/ч.


$S = 540 \text{ км}$ $v_1 = (x + 30) \text{ км/ч}$ $v_2 = x \text{ км/ч}$ разница $t = 3$ $\frac{540}{x} - \frac{540}{x+30} = 3$	$\frac{540}{x} - \frac{540}{x+30} - 3 = 0$ $\frac{540x + 16200 - 540x - 3x^2 - 90x}{x(x+30)} = 0$ $-3x^2 - 90x + 16200 = 0 ; x \neq 0, x \neq -30$ $-3(x^2 + 30x - 5400) = 0   :(-3)$ $x^2 + 30x - 5400 = 0$ $\Delta = 900 + 21600 = 22500 = 250^2$	$x_1 = \frac{-30 + 250}{2} = 110$ $x_2 = \frac{-30 - 250}{2} = -140$ К <sub>2</sub> не удовлетворяет условию скорости не может быть <0 $\Rightarrow$ $x = 110$ $110 - v_2 \Rightarrow v_1 = 110 - 30 =$ $= 80 \text{ км/ч}$ <b>Ответ: 110</b>
--	--	---

22. Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  имеет с графиком ровно одну общую точку.


Ответ:  $0 < m < 2, m > 6$ .



23. Высота  $AH$  ромба  $ABCD$  делит сторону  $CD$  на отрезки  $DH = 21$  и  $CH = 8$ . Найдите высоту ромба.

Ответ: 20.

Задание 23.



Дано:

$ABCD$  - ромб  
 $AB = BC = CD = AD$

$AH$  - высота

$DH = 21$  см  
 $CH = 8$  см

найти:  $AH = ?$

Смотреть лист 4.

Решение:

$$1) CD = DH + HC = 21 + 8 = 29 \text{ (см)};$$

2)  $\triangle ADH$  - прям ( $\angle C = 90^\circ$ ;  $AH$  - высота);

по теореме Пифагора:

$$AH^2 = AD^2 - DH^2;$$

$$AH^2 = 28^2 - 21^2;$$

$$AH^2 = 841 - 441;$$

$$AH^2 = 400;$$

$$AH = \pm \sqrt{400};$$

$$AH = \pm 20 \text{ (см)};$$


$AH = -20$  см - не соответствует условию задачи.

Ответ: 20 см.

24. Две окружности с центрами  $E$  и  $F$  пересекаются в точках  $C$  и  $D$ , центры  $E$  и  $F$  лежат по одну сторону относительно прямой  $CD$ . Докажите, что прямая  $CD$  перпендикулярна прямой  $EF$ .

**Дано:** окружности с центрами  $E$  и  $F$ , пересекаются в точках  $C$  и  $D$ ;  $E, F$  лежат по одну сторону от прямой  $CD$   
**Док-ть:**  $CD \perp EF$

**Решение.**



$\triangle CED$  и  $\triangle CFD$  - равнобедренные т.к.

$EC, ED, FD, FC$  - радиусы

$CD$  - хорда

Проведём высоту  $EH$  и  $FH$  к прямой  $CD$

$EH$  и  $FH$  - расстояние от центра до хорды  
образует прямой угол и является медианой.


~~$\triangle ECD$  и  $\triangle CFD$  равнобедренные и  $\angle CED = \angle CFD$~~  опираются на общую и тоже длину

$EH$  - серединный перпендикуляр. Точка  $F$  лежит на серединном перпендикуляре и равноудалена от концов хорды. т.к.  $F$  лежит на  $EH$  и образует с  $CD$   $90^\circ$   $CD \perp EF$  ч.т.д.

25. В трапеции  $ABCD$  боковая сторона  $AB$  перпендикулярна основанию  $BC$ . Окружность проходит через точки  $C$  и  $D$  и касается прямой  $AB$  в точке  $E$ . Найдите расстояние от точки  $E$  до прямой  $CD$ , если  $AD = 6$ ,  $BC = 5$ .

Ответ:  $\sqrt{30}$ .

25. Дано:  
 $ABCD$ -трапеция,  
 $\text{дк. } D \in C; D, E$   
 $E \in AB$   
 $AD = 6; BC = 5.$   
 Кайти:  $EP = ?$



Решение:

Выполним дан. построение.

$\Rightarrow \triangle BKC \sim \triangle KAD$ , т.к.: 1.  $\angle K$ -общий  
 2.  $\angle KBC = \angle KAD = 90^\circ$ .

Тогда  $\frac{KA}{KB} = \frac{AD}{BC} = \frac{6}{5}$ .  $\Rightarrow$  пусть  $KA = 6x$ ,  
 $KB = 5x$ . Тогда (по теореме Пифагора)  
 $KC = \sqrt{25x^2 + 25} = 5\sqrt{x^2 + 1}$ ;  $KD = \sqrt{36x^2 + 36} =$   
 $= 6\sqrt{x^2 + 1}$ . 3)  $\triangle EKC \sim \triangle DKA$ , т.к.:  
 1.  $\angle K$ -общий  
 2.  $\angle KCE = \angle KAD = 90^\circ$ .

Тогда  $\frac{EP}{AD} = \frac{KE}{KD}$ ; подставив полученные значения.  $\frac{EP}{6} = \frac{KE}{6\sqrt{x^2+1}}$ ;  
 $KE = \sqrt{KC \cdot KD}$  (по теореме о касат. и секущ.) ;  $KE = \sqrt{5\sqrt{x^2+1} \cdot 6\sqrt{x^2+1}} =$   
 $= \sqrt{30 \cdot (x^2 + 1)}$ . Представим данное значение в пропорцию:  
 $\frac{EP}{6} = \frac{\sqrt{30}(x^2+1)}{6\sqrt{x^2+1}}$ . Сократим:  $\frac{EP}{6} = \frac{\sqrt{30}}{6}$ ; тогда:  $EP = \frac{6\sqrt{30}}{6} = \sqrt{30}$ .  
 Ответ:  $EP = \sqrt{30}$ .

### Вариант 3

Таблица оценивания

Задание	20	21	22	23	24	25
Оценка						

**20.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$

Ответ:  $-0,2, 0,5$ .

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$$

Пусть  $\frac{1}{x} = y$ , тогда получим уравнение:

$$y^2 + 3y - 10 = 0$$

По теореме, обратной теореме Виетта:

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = -3, \\ y_1 \cdot y_2 = -10; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = -5, \\ y_2 = 2. \end{cases}$$

Вернемся к исходной переменной:

$$\frac{1}{x} = -5 \quad \text{или} \quad \frac{1}{x} = 2$$

$$x = -\frac{1}{5} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$x = -0,2 \quad x = 0,5$$

Ответ:  $-0,2 ; 0,5$

21. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 55 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 6 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста.

Ответ: 60 км/ч.

21.

	$S, \text{км}$	$v, \text{км/ч}$	$t, \text{ч}$
1	$s$	$x$	$\frac{s}{x}$
2.1	$\frac{s}{2}$	55	$\frac{\frac{s}{2}}{55}$
2.2	$\frac{s}{2}$	$x+6$	$\frac{\frac{s}{2}}{x+6}$

1) пусть  $x$  - скорость первого.

2) путь 2 на первом и 2 участке одинаков.

3) путь путь от А до В =  $s$

а путь первого участка =  $s$ ,

а путь второго участка =  $\frac{s}{2}$  (у 2 машины)

$$\frac{s}{x} = \frac{\frac{s}{2}}{110} + \frac{\frac{s}{2}}{2x+12}$$

$$\frac{1}{110} + \frac{1}{2x+12} - \frac{1}{x} = 0$$

Обр:  $x \neq 0$   $x \neq -6$

$$\frac{2x^2 + 12x + 110x - 220x - 1320 = 0}{(10 \cdot x \cdot 2x + 12)}$$

$$2x^2 - 98x - 1320 = 0 \Rightarrow x^2 - 49x - 660 = 0$$

$$D = 2601 + 5280 = 7681$$

$$x_1 = \frac{49 + \sqrt{7681}}{2}$$

$$x_2 = \frac{49 - \sqrt{7681}}{2}$$


б. к.  $\sqrt{7681} = 87$   
перв. первый корень

$$\text{Обр: } \frac{49 + \sqrt{7681}}{2}$$

2

22. Постройте график функции  $y = \frac{9x+1}{9x^2+x}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ: 81.



23. Углы  $B$  и  $C$  треугольника  $ABC$  равны соответственно  $62^\circ$  и  $88^\circ$ . Найдите  $BC$ , если радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , равен 12.

Ответ: 12.

$\angle B = 62^\circ$   
(радиусы на каске)  
 $\angle C = 88^\circ$

Дано:

Окружность  
 $ABC$  — описанная  
 $r = 12$

$\angle B$  и  $\angle C$  соответствственно  $62^\circ$  и  $88^\circ$

Решение:

(1) Рассмотрим трапециевидный  $COB$ -равнобедренный, т.е.  $CO = BO$  — радиусы окружности.

(2) Найдём дугу, на которую опирается угол  $COB - BC$ .  
 $BC = 360^\circ - 88^\circ - 62^\circ - 62^\circ = 60^\circ \Rightarrow \angle COB - \text{допл. угол} = \text{дуга, на}$   
 (чутьчики есть окружности  $= 360^\circ$ ). которую опирается.

(3) Проведён висячий  $\overset{\text{OK}}{\text{OK}}$  из вершины  $O$ , трапециевидный  $COB$ , к стороне  $BC$ , которая будет висячей и медианой в биссектрисой, т.е. по следствию равнобедренного трапециевидного  $\Rightarrow$

трапециевидный  $OKB$  — равнобедренный прямосторонний.

$\angle KOB = 60^\circ : 2 = 30^\circ \Rightarrow$   
напомним что углы на противолежащих сторонах  $\angle KOB = \angle OKB = 30^\circ$  и  $\angle KBO = 120^\circ$ .

$$(4) KB = KO = \frac{OB}{2} = \frac{12}{2} = 6.$$


Напомним что углы на противолежащих сторонах  $\angle KOB = \angle OKB = 30^\circ$  и  $\angle KBO = 120^\circ$ .

$$(5) KB = KC = 6 + 6 = 12 = BC$$

Ответ:  $BC = 12$ .

24. Сторона  $AB$  параллелограмма  $ABCD$  вдвое больше стороны  $BC$ . Точка  $L$  — середина стороны  $AB$ . Докажите, что  $CL$  — биссектриса угла  $BCD$ .

N 24



Дано:  $ABCD$  — парал-м

$$BC = 2 AB$$

$L$  — середина  $AB$   $AL = LB$

Док-ть:  $CL$  — биссектриса  $\angle BCD$

Док-во:

Сначала док. построим  $H$  — середина  $CD$

т.к. в парал-м противоположные стороны равны, то в

$$\triangle BCD \quad BL = CH \Rightarrow AL = LB = CH = HD = x$$

Обозначим:  $AB = 2x$ ,  $BC = x$ .

т.к.  $LB = LA = x \Rightarrow LB = BC = x \Rightarrow \triangle LBC$  — равнобедр.  $\angle LBC = \angle BCL$

$BC = LH$  (т.к. в парал-м противоположные  
стороны равны)  $\angle BHL = \angle BCL$

↓

$$BC = LH = x$$

$$LB = CH = x$$

$\Rightarrow LH = HC \Rightarrow \triangle LCH$  — равнобедр.  $\angle CLH = \angle LCH$


↓

$\angle DCL = \angle LCH$  ( $CL$  — биссектр.)

Ч.т.д.

25. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 160, а площадь равна 1280, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

Ответ: 6,4.



Дано: ABCD - трапеция  $AB = CD$

$$P_{ABCD} = 160 \quad S_{ABCD} = 1280.$$

Можно вписать окружность.

Найти: OH

Решение:

$BC + AD = AB + CD$ , т.к. по условию в трапецию можно вписать окружность.

$$P = 160 \text{ - по усл. } BC + AD = AB + CD = \frac{P_{ABCD}}{2} = 80, \quad AB = CD = 40$$

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot HH_1, \quad S = 1280 \text{ - по усл. } BC + AD = 80$$

$$\Rightarrow HH_1 = 1280 \cdot \frac{80}{2} = 1280 : 40 = 32$$

$$CC_1 = HH_1 = 32. \quad CD = 40 \text{ - б. о. } CC_1 D$$

$$\text{По т. Пифагора } C_1 D^2 = CD^2 - CC_1^2$$

$$C_1 D = \sqrt{1600 - 1024} = \sqrt{576} = 24$$

$$AB_1 = C_1 D = 24, \quad B_1 C_1 = BC$$

$$AD = AB_1 + C_1 D + B_1 C_1 = 48 + B_1 C_1 \quad AD + BC = 80, \quad B_1 C_1 + BC = 80 - 48 = 32$$

$$B_1 C_1 = BC = 16 \quad AD = 48 + 16 = 64.$$

$\triangle BOC \sim \triangle AOD$ , т.к.:

$\angle A = \angle C$  - наименее изменяющие при  $BC \parallel AD$  и симметрии AC

$\angle B = \angle D$  - наименее изменяющие при  $BC \parallel AD$  и симметрии BD

$$\frac{AD}{BC} = \frac{64}{16} = 4, \quad k=4 \quad \frac{OH_1}{OH} = \frac{3}{1}$$

$$HH_1 = OH_1 + OH = 3 + 1 = 4 \text{ - частн.}$$

$$OH = \frac{HH_1}{4} = \frac{32}{4} = 8$$

Ответ: 8

**Вариант 4**

Таблица оценивания

Задание	20	21	22	23	24	25
Оценка						

20. Решите уравнение  $(x - 2) \cdot (x^2 + 8x + 16) = 7(x + 4)$ .

Ответ:  $-5, -4, 3$ .

$$\begin{aligned}
 & 20. (x-2)(x^2+8x+16) = 7(x+4) \quad D = b^2 - 4ac \\
 & (x-2)(x+4)^2 = 7(x+4) \quad D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 4 + 60 = 64 \\
 & (x-2)(x+4)^2 - 7(x+4) = 0 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \\
 & \cancel{(x-2)} - 7 = 0 \quad x_1 = \frac{-2 - \sqrt{64}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 - 8}{2} = \frac{-10}{2} = -5 \\
 & x - 2 - 7 = 0 \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{64}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 + 8}{2} = \frac{6}{2} = 3 \\
 & (x-2)(x+4) - 7 = 0 \\
 & x^2 + 4x - 2x - 8 - 7 = 0 \\
 & x^2 + 2x - 15 = 0 \\
 & a = 1 \quad b = 2 \quad c = -15 \\
 & \text{Ответ: } x_1 = -5, x_2 = 3.
 \end{aligned}$$

21. Два велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Ответ: 14 км/ч.

	$v$	$t$	$s$
1 вел.	$x+2$	$\frac{224}{x+2}$	224
2 вел.	$x$	$\frac{224}{x} + 2$	224

$$\frac{224}{x+2} = \frac{224}{x} + 2$$

$$\frac{224}{x+2} - \frac{224}{x} + 2$$

$$224x - 224x - 224 \cdot 2$$

$$\frac{224x - 224x - 224 \cdot 2 + 2x^2 + 4x}{x^2 + 2x}$$

$$\frac{+2x^2 + 4x - 448}{x^2 + 2x} = 0$$

$$2x^2 + 4x - 448 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-448) = \\ = 16 + 3584 = 3600$$

$$x_1 = \frac{-4 + \sqrt{3600}}{2 \cdot 2} = \frac{-4 + 60}{4} = \frac{56}{4} = 14$$

$$x_2 = \frac{-4 - \sqrt{3600}}{2 \cdot 2} = \frac{-4 - 60}{4} = \frac{-64}{4} = -16$$

-16 нас не удовлетворяет, так как скорость не может быть отрицательной  $x > 0$

Ответ: 14 км/ч скорость второго велосипедиста

22. Постройте график функции  $y = \frac{9x+1}{9x^2+x}$  и определите, при каких значениях  $k$  прямая  $y = kx$  имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ: 81.


$$y = \frac{9x+1}{9x^2+x}$$

$$y = \frac{9x+1}{x(9x+1)}$$

$$\mathcal{D}(y) \in \mathbb{R} \setminus \{0; -\frac{1}{9}\}$$

$$y = \frac{1}{x}$$

$$E(y) \in \mathbb{R} \setminus \{0; -9\}$$



Для того, чтобы иметь

с графиком ф-ии  $y = \frac{9x+1}{9x^2+x}$  только

1 (•) пересечение график ф-ии

$y = kx$  должен проходить

через волчью точку, имеющую координаты  $(-\frac{1}{9}, -9)$ .

Подставим эти значения и найдем  $k$ .

$$-9 = k \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) / \cdot (-9)$$

$$k = 81.$$

Ответ: 81

23. Углы  $B$  и  $C$  треугольника  $ABC$  равны соответственно  $66^\circ$  и  $84^\circ$ . Найдите  $BC$ , если радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , равен 15.

Ответ: 15.

23.

$$\angle A = 180 - 66 - 84 = 30^\circ$$

$$\frac{BC}{\sin \angle A} = 2R$$

$$\text{по т. \sin \frac{\text{угол}}{2}} \frac{BC}{\sin 30} = 30, \quad \frac{BC}{\frac{1}{2}} = 30 \Rightarrow BC = 60$$

Ответ: 60

24. Сторона  $AB$  параллелограмма  $ABCD$  вдвое больше стороны  $BC$ . Точка  $L$  — середина стороны  $AB$ . Докажите, что  $CL$  — биссектриса угла  $BCD$ .

№ 24

Доказательство:  $\angle 1 = \angle 2$  (известно, что при параллельных прям.)

$AL = LB = BC$ , так как по условию сторона  $AB$  вдвое больше  $BC$  и  $L$  — середина стор.  $AB$

$\Rightarrow \triangle LBC$  равнобедренный  $\Rightarrow \angle 2 = \angle 3$ .

$\Rightarrow \angle 1 = \angle 3 \Rightarrow CL$  — биссектриса  $\angle BCD$ .  $\square$  П.Д.

25. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 200, а площадь равна 2000, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

Ответ: 8.

$S = 2000; P = 200 \quad PM - ?$

1) по cb-бу описан четыр.  $BC + AD = AB + CD$ , и  
 $P/2 = 100$ , но cb-бу равнобедр.  $AB = CD$ , и  
 т.ч.  $AB = x$ ,  $CD = x$   
 $100 = 2x$

2)  $S_{TP} = \frac{AD+BC}{2} \cdot h$        $x = 50 \quad AB = CD = 50$   
 проводим перпендикульры  $BH$  и  $CK$       3)  $\triangle ABH: \angle AHB = 90^\circ$   
 $S_{TP} = 2000$        $AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{2500 - 1600} = \sqrt{900} = 30$

$\frac{100}{2} \cdot BH = 2000$       4)  $BH = CK$  т.к. взаимно докл. перпен.  
 при  $\perp$  к  $BC$  и  $AD$ , и  $\perp$  к  $BC$  и  $CK$   $\Rightarrow$  прямые, и  
 $BC = CK$   
 $AD = AH + HK + KD + KC$

$50 \cdot BH = 2000$       5)  $\triangle ABH \sim \triangle KDC$  по вкл. углам.  
 $BH = 40$        $\angle AHB = \angle CKD = 90^\circ; CD = AB$  по усл.;  $BH = CK$  взаимно  
 докл. перпен при  $\perp$  к  $BC$  и  $AD$ , и  
 $HK$

6)  $\frac{BC}{AD} = \frac{20}{50} = \frac{1}{4}$       6)  $AH = \sqrt{50^2 - 30^2} = \sqrt{2500 - 900} = \sqrt{1600} = 40$   
 проводим  $PQ$        $AD + BC = 100$   
 $AMD \sim BMC$        $CD + BC + HK = 100$   
 $\angle BMC = \angle AMD$  т.к.  
 Вертик.  
 $BC$        $CD + 2HK = 100$   
 $AD : CD$        $HK = 20; 40 = 100 - 20 = 80$   
 $PQ = 40 = BH$  т.к. взаимно докл. перпен при  $\perp$  к  $BC$  и  $AD$   
 $\frac{PM}{MQ} = \frac{1}{4}$        $P + 1 - x \quad x + 4x = 40$   
 $MQ = 4x \quad 5x = 40$   
 $PQ = PM + PQ$        $x = 8$ , с.л.  $PM = 4$   
 $On\ berm: 4$

### Вариант 5

Таблица оценивания

Задание	20	21	22	23	24	25
Оценка						

**20.** Решите уравнение  $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$ .

Ответ:  $-0,2; 0,5$ .

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$$

$$\frac{1}{x^2} + \frac{3x}{x^2} - \frac{10x^2}{x^2} = 0$$

$$\frac{1 + 3x - 10x^2}{x^2} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 + 3x - 10x^2 = 0 \\ x^2 \neq 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0,5 \\ x_2 = -0,25 \\ x \neq 0 \end{array} \right.$$

$$-10x^2 + 3x + 1 = 0$$

$$a = -10, b = 3, c = 1$$

$$\Delta = 9 + 40 = 49, \Delta > 0$$

$$x_1 = \frac{-3 - 7}{-20} = \frac{-10}{-20} = 0,5$$

$$x_2 = \frac{-3 + 7}{-20} = \frac{5}{-20} = -0,25.$$

$x_1 = 0,5$   
 $x_2 = -0,25$

*Ответ:  $-0,25; 0,5$ .*

21. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 55 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 6 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста.

Ответ: 60 км/ч.

21.				
	S км	v км/ч (I-ая полб.)	v км/ч (II-ая полб.)	t ч.
II авт.	2	55	x + 6	?
I авт.	2	v км/ч.	x	?
		$\frac{1}{55} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{x}$	$\cdot 55(x+6)$	
		$x(x+6) + 55x = 55x + 330$		
		$x^2 + 6x + 55x = 110x + 660$		
		$x^2 + 6x + 55x - 110x - 660 = 0$		
		$x^2 - 49x - 660 = 0$		
		$D = b^2 - 4ac = -49^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-660) = 2401 + 2640 = 5041$		
		$x_1 = 60$ км/ч.		
		$x_2 = -11$ не удовлетворяет условию задачи.		

22. Постройте график функции

$$y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

Определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y = m$  имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответ:  $0 < m < 2, m > 6$ .

№22.

$$y = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{при } x \geq -2, \\ -\frac{6}{x} & \text{при } x < -2. \end{cases}$$

I  $y = x^2 + 2$  – квадратичная функция, график – парабола,  $a > 0$ , ветви направлены вверх

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = 0$$


$$y_0 = 0 + 2 = 2$$

$$O(0; 2)$$

x	0	2	-2
y	2	6	6

II  $y = -\frac{6}{x}$  – функция обратной пропорциональности, график – гипербола, симметрична относительно оси осях


x	1	-1	2	-2	3	-3	6	-6
y	-6	6	-3	3	-2	2	-1	1



Прямая  $y = m$  имеет с графиками ровно одну общую точку при  $m \in (0, 2) \cup (6, +\infty)$

23. Углы  $B$  и  $C$  треугольника  $ABC$  равны соответственно  $66^\circ$  и  $84^\circ$ . Найдите  $BC$ , если радиус окружности, описанной около треугольника  $ABC$ , равен 15.

Ответ: 15.



Дано: Окр( $O; R$ ) описан  
около  $\triangle ABC$

$$\angle B = 66^\circ; \angle C = 84^\circ$$

$$R = 15$$

Найти:  $BC$

Решение

$$\rightarrow \angle A = 180^\circ - (66^\circ + 84^\circ) = 30^\circ \text{ (по сумме углов \(\triangle\))}$$

$$2) \frac{AB}{\sin \angle C} = \frac{BC}{\sin \angle A} = \frac{AC}{\sin \angle B} = 2R \quad (\text{зак } \triangle ABC, \text{ где } R - \text{радиус описан. окр.})$$

$$\frac{BC}{\sin \angle A} = 2R$$

$$\frac{BC}{\sin 30^\circ} = 2 \cdot 5$$


$$\frac{BC}{\frac{1}{2}} = 10$$

$$BC = 10 \cdot \frac{1}{2}$$

$$BC = 5$$

Ответ:  $BC = 5$

24. Сторона  $AB$  параллелограмма  $ABCD$  вдвое больше стороны  $BC$ . Точка  $L$  — середина стороны  $AB$ . Докажите, что  $CL$  — биссектриса угла  $BCD$ .



Дано  $ABCD$  — параллелограмм  
 $AB$  больше  $BC$  в 2 раза  
 $L$  — середина  $AB$   
 $D$ -тв:  $CL$  — биссектриса.  
 $D$ -во.

1) Принадим сторону  $AB$  за  $x$ , тогда  $BC = \frac{x}{2}$

2)  $AL = \frac{x}{2}$  и  $LB = \frac{x}{2}$ , т.к.  $L$  — середина  $AB$

3) Рассмотрим  $\triangle LBC$

$LB = BC = \frac{x}{2} \Rightarrow \triangle LBC$  равнобедренный  $\Rightarrow \angle LCB = \angle CLB$  как углы при основании равнобедренного треугольника.

4) Продолжим прямую  $LC$  до точки  $F$

$\angle ALE = \angle CLB$  как вертикальные.

5)  $\angle LCB = \angle CLB$  (по доказанному)  
 $\angle ALE = \angle CLB$  (по доказанному)  $\Rightarrow \angle LCB = \angle ALE$

6) Продолжим прямую  $LC$  до точки  $F$

7)  $\angle ALE = \angle DCE$  как соответственные углы при  $AB \parallel DC$  (по свойству параллел-ки) и секущей  $EF$ .

8)  $\angle LCB = \angle ALE$   
 $\angle DCE = \angle ALE$   $\Rightarrow \angle LCB = \angle DCE \Rightarrow CL$  является биссектрисой  $\angle BCD$

Ч. д. т. д.

25. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 200, а площадь равна 2000, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

Ответ: 8.

25. Дано:

$$P = 200$$

$$S = 2000$$

$MO = ?$

Решение:

1.  $AB = CD$  m.k.  $ABCD$  -  $\mu/\delta$  трапеция

2.  $\angle A = \angle D$  m.k.  $ABCD$  -  $\mu/\delta$  трапеция

3.  $P = AB + BC + CD + AD$ , m.k.  $AB = CD \Rightarrow P = 2AB + BC + AD$ ;

$$BC + AD = P - 2AB$$


$$4. S = \frac{a+b}{2} \cdot h ; S = \frac{BC + AD}{2} \cdot CH ; CH = \frac{2S}{BC + AD}$$

$$5. MO = \frac{1}{3} CH ; \quad 6. 3BC = AD \quad \Rightarrow$$

$$7. CH = \frac{2 \cdot 200}{P - 2AB} = \frac{2 \cdot 200}{200 - 40} \cdot \frac{40}{40} = 40$$

$$6. MO = \frac{1}{3} \cdot \frac{40}{4} = \frac{40}{8}$$

$$\text{Ответ: } \frac{40}{3}$$



## Ответы и комментарии к материалам части 4

Вариант	Задание	Оценка	Комментарий
1	20	2	Решение полное и верное
	21	2	Решение полное и верное
	22	1	График построен. Значения параметра найдены неверно
	23	2	Решение полное и верное, отсутствие обоснования того, что точка $L$ – середина $BC$ , не является недостатком
	24	1	Последний шаг не сделан Есть описка: угол $BCL$ вместо $DCL$
	25	2	Решение полное и верное
2	20	2	Решение полное и верное
	21	1	Вычислительная ошибка при извлечении квадратного корня
	22	2	Решение верное. На графике не показана выколотая точка, небрежно изображена гипербола. Оба эти недостатка не критические
	23	2	Решение полное и верное. Есть описка: $\angle C = 90^\circ$
	24	0	Рассуждения несвязные. Логические и геометрические ошибки
	25	1	Решение понятное и верное. Имеются избыточные рассуждения и неточности, повторяющаяся описка (точка $C$ вместо точки $P$ ).
3	20	2	Решение полное и верное
	21	1	Арифметическая ошибка, ответ неверный
	22	0	Вид функции не определен, точки не выколоты, дальнейшие вычисления содержат многочисленные ошибки
	23	2	Решение полное и верное, хотя нерациональное
	24	0	Равенство нужных углов не доказано, многочисленные логические ошибки
	25	1	Арифметическая ошибка

	20	0	Алгебраическая ошибка: потерян корень
	21	0	Алгебраическая ошибка при решении уравнения
4	22	2	Решение полное и верное
	23	1	Арифметическая ошибка
	24	2	Решение полное и верное
	25	1	Описка, приведшая к неверному ответу
	20	1	Арифметическая ошибка
	21	0	Неверно составлена таблица, потеряны единицы измерения
5	22	2	Решение полное и верное
	23	1	Описка: радиус 5 вместо 15
	24	2	Доказательство полное и верное, несмотря на лишние рассуждения и неверно написанную букву <i>C</i> в обозначении угла <i>DCE</i>
	25	0	Несвязные рассуждения, неверные утверждения